


TRIGONOMETRY




$$\begin{aligned} \bullet \sin \theta &= \frac{P}{H} & \frac{L}{K} \\ \bullet \cos \theta &= \frac{B}{H} & \frac{A}{K} \\ \bullet \tan \theta &= \frac{P}{B} & \frac{L}{A} \\ \bullet \operatorname{Cosec} \theta &= \frac{1}{\sin \theta} = \frac{H}{P} & \frac{K}{L} \\ \bullet \sec \theta &= \frac{1}{\cos \theta} = \frac{H}{B} & \frac{K}{A} \\ \bullet \cot \theta &= \frac{1}{\tan \theta} = \frac{B}{P} & \frac{A}{L} \end{aligned}$$

Trick

Sona $\downarrow$ Pandit $\downarrow$ Har
 Chandi $\downarrow$ Badri $\downarrow$ Har
 Tole $\downarrow$ Prasad $\downarrow$ Bole
 $\frac{S}{L}$ $\frac{C}{A}$ $\frac{T}{L}$


TRIGONOMETRIC TABLE OF ACUTE ANGLE :-

angle	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	N.D
$\operatorname{Cosec} \theta$	N.D	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
$\sec \theta$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	N.D
$\cot \theta$	N.D	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0




$$\frac{P}{H} = 0 \quad \sin 0^\circ = 0$$


$P=0$ $\theta=0$




$$\sin 30^\circ = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}$$



$$\sin 45^\circ = \frac{R}{\sqrt{2}R} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$




$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}R}{2R} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



$P=H$


$$\sin \theta = \frac{P}{H}$$

$$\sin 90^\circ = \frac{P}{P} \quad (1)$$




$$\cos \theta = \frac{B}{H}$$


$\cos 0^\circ = 1$



$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}R}{2R} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$\cos 60^\circ = \frac{1R}{2R} = \frac{1}{2}$$





$$\cos 45^\circ = \frac{R}{\sqrt{2}R} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

✱ $\left\{ \tan 90^\circ = \frac{1}{0} \right\} \Rightarrow \text{Not defined.}$



$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

TRIGONOMETRY

QUADRANT (चतुर्थांश)




- $R = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Radius always positive



$$\frac{\sin}{\cos} = (+)$$


	I	II	III	IV
$\frac{P}{H}$ Sin	+	+	-	-
$\frac{B}{H}$ Cos	+	-	-	+
$\frac{P}{H}$ tan	+	-	+	-
$\frac{H}{P}$ Cosec	+	+	-	-
$\frac{H}{B}$ Sec	+	-	-	+
$\frac{B}{P}$ Cot	+	-	+	-

Ex:-




- $\sin \theta = \frac{4}{H}$

- $\cos \theta = -\frac{3}{H}$



Sine Graph



$\sin 180^\circ = 0$
 $\sin 360^\circ = 0$

$\sin \theta = 0$

- if $\theta = \text{even multiples of } 90^\circ$ (90° के सम गुणज)

Ex:- (A) (B)


① $\sin 39^\circ < \sin 72^\circ$

② $\sin 102^\circ > \sin 155^\circ$

③ $\sin 55^\circ > \sin 179^\circ$

	Min. Value	Max. Value
$\sin \theta$	-1	+1

Cosine Graph



	Min. Value	Max. Value
$\cos \theta$	-1	+1

$$\cos 90^\circ = 0$$

$$\cos 270^\circ = 0$$

$\cos \theta = 0$

- $\theta = \text{odd multiples of } 90^\circ$ (90° के विषम गुणज)


Ex:- (A) (B)

$\cos \theta$ $\cos 29^\circ > \cos 70^\circ$

$\cos 120^\circ > \cos 170^\circ$

Tan Graph

* always increasing




Ex:-

- ① $\tan 30^\circ < \tan 60^\circ$
- ② $\tan 127^\circ < \tan 145^\circ$

TRIGONOMETRY

CONVERSION OF TRIGONOMETRIC RATIO



$$\sin \theta = \frac{A}{C}$$

$$\cos (90 - \theta) = \frac{A}{C}$$

$$\boxed{\cos (90 - \theta) = \sin \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{A}{B}$$

$$\cot (90 - \theta) = \frac{A}{B}$$

$$\boxed{\cot (90 - \theta) = \tan \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{C}{B}$$

$$\operatorname{cosec} (90 - \theta) = \frac{C}{B}$$



$$\boxed{\operatorname{cosec} (90 - \theta) = \sec \theta}$$

Trick

S sin, cosec (+)	A All (+)
T tan, cot (+)	C cos, sec (+)

ROJGAR WITH ANKIT

$$\begin{aligned}\sin(90-\theta) &= +\cos\theta \\ \cos(90-\theta) &= +\sin\theta \\ \tan(90-\theta) &= +\cot\theta \\ \cot(90-\theta) &= +\tan\theta \\ \sec(90-\theta) &= +\operatorname{cosec}\theta \\ \operatorname{cosec}(90-\theta) &= +\sec\theta\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\sin(90+\theta) &= +\cos\theta \\ \cos(90+\theta) &= -\sin\theta \\ \tan(90+\theta) &= -\cot\theta \\ \cot(90+\theta) &= -\tan\theta \\ \sec(90+\theta) &= -\operatorname{cosec}\theta \\ \operatorname{cosec}(90+\theta) &= +\sec\theta\end{aligned}$$



$(90R \pm \theta)$

$$0^\circ < \theta < 90^\circ$$

$R \rightarrow$ odd Number
विषम संख्या

Trigonometric Ratio
↓
CHANGES

$$\begin{aligned}\sin(270-\theta) &= -\cos\theta \\ \cos(270-\theta) &= -\sin\theta \\ \tan(270-\theta) &= +\cot\theta \\ \cot(270-\theta) &= +\tan\theta \\ \sec(270-\theta) &= -\operatorname{cosec}\theta \\ \operatorname{cosec}(270-\theta) &= -\sec\theta\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\sin(270+\theta) &= -\cos\theta \\ \cos(270+\theta) &= +\sin\theta \\ \tan(270+\theta) &= -\cot\theta \\ \cot(270+\theta) &= -\tan\theta \\ \sec(270+\theta) &= +\operatorname{cosec}\theta \\ \operatorname{cosec}(270+\theta) &= -\sec\theta\end{aligned}$$

$$\text{angle} = (90R \pm \theta)$$

$$0^\circ < \theta < 90^\circ$$

$R \rightarrow$ even Number
सम संख्या

Trigonometric Ratio
↓
CHANGE नहीं होंगे

$$\sin(180^\circ - \theta) = + \sin \theta$$



$$\cos(180^\circ - \theta) = - \cos \theta$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = - \tan \theta$$

$$\cot(180^\circ - \theta) = - \cot \theta$$

$$\sec(180^\circ - \theta) = - \sec \theta$$

$$\operatorname{cosec}(180^\circ - \theta) = + \operatorname{cosec} \theta$$



$$\sin(180^\circ + \theta) = - \sin \theta$$

$$\cos(180^\circ + \theta) = - \cos \theta$$

$$\tan(180^\circ + \theta) = + \tan \theta$$

$$\cot(180^\circ + \theta) = + \cot \theta$$

$$\sec(180^\circ + \theta) = - \sec \theta$$

$$\operatorname{cosec}(180^\circ + \theta) = - \operatorname{cosec} \theta$$

$$\sin(360^\circ + \theta) = + \sin \theta$$



$$\cos(360^\circ + \theta) = + \cos \theta$$

$$\tan(360^\circ + \theta) = + \tan \theta$$

$$\cot(360^\circ + \theta) = + \cot \theta$$

$$\sec(360^\circ + \theta) = + \sec \theta$$

$$\operatorname{cosec}(360^\circ + \theta) = + \operatorname{cosec} \theta$$



$$\sin(360^\circ - \theta) = - \sin \theta$$

$$\cos(360^\circ - \theta) = + \cos \theta$$

$$\tan(360^\circ - \theta) = - \tan \theta$$

$$\cot(360^\circ - \theta) = - \cot \theta$$

$$\sec(360^\circ - \theta) = + \sec \theta$$

$$\operatorname{cosec}(360^\circ - \theta) = - \operatorname{cosec} \theta$$

$$\sin(-\theta) = \sin(0^\circ - \theta)$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$


$$\cos(-\theta) = \cos(0^\circ - \theta) = +\cos \theta$$

$$\sec(-\theta) = +\sec \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\cot(-\theta) = -\cot \theta$$

$$\operatorname{cosec}(-\theta) = -\operatorname{cosec} \theta$$



Q) $\cos(120^\circ)$

$$\cos(90^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$


$$\cos(90 + \theta) = -\sin \theta$$



Q) $\sin(150^\circ)$

$$\begin{aligned} \sin(90 + 60) \\ = +\cos 60^\circ \\ = +\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(180 - 30) \\ = +\sin 30^\circ \\ = +\frac{1}{2} \end{aligned}$$




Q) $\cos(225^\circ)$

$$\cos(180^\circ + 45^\circ)$$

$$= -\cos 45^\circ$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}}$$



Q) $\tan(405^\circ)$

$$\tan(360 + 45^\circ)$$

$$= +\tan 45^\circ$$


$$= +1$$

Q) $\sin(750^\circ)$

$$\sin(360 \times 2 + 30^\circ)$$

$$+ \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$



Q) Find the value of $\cos 120^\circ$.

$\cos 120^\circ$ का सटीक मान ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} & \cos(90+30^\circ) \\ & -\sin 30^\circ \\ & = -\frac{1}{2} = -0.5 \end{aligned}$$

Q) $\sin(1125^\circ)$

$$\begin{aligned} & \sin(360 \times 3 + 45^\circ) \\ & + \sin 45^\circ \\ & = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$




Q) $\sin(-1125^\circ)$

$$\begin{aligned} & \sin(-\theta) = -\sin \theta \\ & -\sin(1125^\circ) \\ & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Q) Find the value of $\cos 225^\circ$

$\cos 225^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} & \cos(180+45^\circ) \\ & -\cos 45^\circ \\ & = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1.414}{2} \\ & = -0.7071 \end{aligned}$$



Q) What will be the value of $\sin(-405^\circ)$

$\sin(-405^\circ)$ का मान क्या होगा।

$$\begin{aligned} & -\sin(405^\circ) \\ & -[\sin(360+45^\circ)] \\ & -[+\sin 45^\circ] \\ & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Q) Find the value of $\operatorname{cosec}(-1410^\circ)$
 $\operatorname{cosec}(-1410^\circ)$ का मान ज्ञात कीजिए-

$$- \operatorname{cosec}(1410)$$

$$- [\operatorname{cosec}(1440 - 30^\circ)]$$

$$- [\operatorname{cosec}(360 \times 4 - 30^\circ)]$$

$$- [-\operatorname{cosec} 30^\circ]$$

$$+ \operatorname{cosec} 30^\circ = 2$$



TRIGONOMETRY

$$\begin{aligned}
 \textcircled{Q} \quad & \cos 570^\circ \sin 510^\circ + \sin (-330^\circ) (\cos 390^\circ) = ? \\
 & \cos (360 + 210) \sin (360 + 150) - \sin (360 - 30) \cos (360 + 30) \\
 & \cos 210^\circ \sin 150^\circ + \sin 30^\circ \cos 30^\circ \\
 & \cos (180 + 30^\circ) \sin (180 - 30) \quad \frac{1}{2} \quad = \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 & -\cos 30^\circ \sin 30^\circ \\
 & = -\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 & \quad \quad \quad 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{Q} \quad & \operatorname{cosec} 2910^\circ + \sec 4260^\circ + \tan 2565^\circ + \cot 1755^\circ = ? \\
 & \operatorname{cosec} (360 \times 8 + 30) + \sec (360 \times 12 - 60) + \tan (360 \times 7 + 45) + \\
 & \quad \quad \quad \cot (360 \times 5 - 45) \\
 & \operatorname{cosec} 30^\circ + \sec 60^\circ + \tan 45^\circ - \cot 45^\circ \\
 & \quad \quad \quad 2 + 2 + 1 - 1 \\
 & \quad \quad \quad 4
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{Q} \quad \text{Find the value of } \cos 0^\circ + \cos 30^\circ - \tan 45^\circ + \operatorname{cosec} 60^\circ + \cot 90^\circ$$

$\cos 0^\circ + \cos 30^\circ - \tan 45^\circ + \operatorname{cosec} 60^\circ + \cot 90^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$1 + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} + 0$$

$$\frac{\cos 90^\circ}{\sin 90^\circ} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\frac{3 + \frac{4}{\sqrt{3}}}{2\sqrt{3}} = \frac{7}{2\sqrt{3}}$$

$$\textcircled{Q} \quad \text{The value of } \frac{\cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$$

$$\frac{\cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ} \text{ का मान है } 1$$

$$\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \times \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 - 1}{1}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\frac{1}{4} + 4 \times \frac{4}{3} - 1$$

$$\frac{1}{4} + \frac{16}{3} - 1$$

$$\frac{67}{12} - 1$$

$$\frac{55}{12}$$

Q) If $A = \frac{\sin 45^\circ - \sin 30^\circ}{\cos 45^\circ + \cos 60^\circ}$ and $B = \frac{\sec 45^\circ - \tan 45^\circ}{\operatorname{cosec} 45^\circ + \cot 45^\circ}$, then which one of the following is correct?

यदि $A = \frac{\sin 45^\circ - \sin 30^\circ}{\cos 45^\circ + \cos 60^\circ}$ और $B = \frac{\sec 45^\circ - \tan 45^\circ}{\operatorname{cosec} 45^\circ + \cot 45^\circ}$ तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

$$A = \frac{\sin 45^\circ - \sin 30^\circ}{\cos 45^\circ + \cos 60^\circ}$$

$$\frac{\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}}$$

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} \times \frac{2 - \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$$

$$\frac{(2 - \sqrt{2})^2}{4 - 2} = \frac{4 + 2 - 4\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{6 - 4\sqrt{2}}{2}$$

$$3 - 2\sqrt{2} \rightarrow \textcircled{A}$$

$$A = B$$

$$B = \frac{\sec 45^\circ - \tan 45^\circ}{\operatorname{cosec} 45^\circ + \cot 45^\circ}$$

$$\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1} \times \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$\frac{(\sqrt{2} - 1)^2}{2 - 1} = \frac{2 + 1 - 2\sqrt{2}}{1}$$

$$3 - 2\sqrt{2} \rightarrow \textcircled{B}$$

Q) Value of the expression

$$\frac{1+2 \sin 60^\circ \cos 60^\circ}{\sin 60^\circ + \cos 60^\circ} + \frac{1-2 \sin 60^\circ \cos 60^\circ}{\sin 60^\circ - \cos 60^\circ} \text{ is}$$

$$\frac{1+2 \sin 60^\circ \cos 60^\circ}{\sin 60^\circ + \cos 60^\circ} + \frac{1-2 \sin 60^\circ \cos 60^\circ}{\sin 60^\circ - \cos 60^\circ} \text{ व्यंजक का मान है।}$$

$$\frac{\sin^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ + 2 \sin 60^\circ \cos 60^\circ}{\sin 60^\circ + \cos 60^\circ} + \frac{\sin^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ - 2 \sin 60^\circ \cos 60^\circ}{\sin 60^\circ - \cos 60^\circ}$$

$$\frac{(\sin 60^\circ + \cos 60^\circ)^2}{\cancel{(\sin 60^\circ + \cos 60^\circ)}} + \frac{(\sin 60^\circ - \cos 60^\circ)^2}{\cancel{(\sin 60^\circ - \cos 60^\circ)}}$$

$$\cancel{\sin 60^\circ + \cos 60^\circ} + \cancel{\sin 60^\circ - \cos 60^\circ}$$

$$2 \sin 60^\circ$$

$$2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sqrt{3}$$

Q) The value of $\frac{4 \tan^2 30^\circ + \frac{1}{4} \sin^2 90^\circ + \frac{1}{8} \cot^2 60^\circ + \sin^2 30^\circ \cos^2 45^\circ}{\sin 60^\circ \cos 30^\circ - \cos 60^\circ \sin 30^\circ}$ is

$$\frac{4 \tan^2 30^\circ + \frac{1}{4} \sin^2 90^\circ + \frac{1}{8} \cot^2 60^\circ + \sin^2 30^\circ \cos^2 45^\circ}{\sin 60^\circ \cos 30^\circ - \cos 60^\circ \sin 30^\circ} \text{ का मान है :}$$

$$\frac{4 \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{1}{4} \times 1 + \frac{1}{8} \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}$$

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}}$$

$$\frac{4 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{8}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}}$$

$$\frac{\frac{4}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{24} + \frac{1}{8}}{\left(\frac{1}{2}\right)}$$

$$\frac{\frac{4}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{24} + \frac{1}{8}}{\left(\frac{1}{2}\right)}$$

$$\left(\frac{11}{2}\right)$$

$$\frac{(32+6+1+3) \times 2}{24_{12}}$$

$$\frac{\cancel{42}}{\cancel{12}} \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$$

Q) The value of $\frac{\operatorname{cosec}^2 30^\circ \sin^2 45^\circ + \sec^2 60^\circ}{\tan 60^\circ \operatorname{cosec}^2 45^\circ - \sec^2 60^\circ \tan 45^\circ}$ is

$$\frac{\operatorname{cosec}^2 30^\circ \sin^2 45^\circ + \sec^2 60^\circ}{\tan 60^\circ \operatorname{cosec}^2 45^\circ - \sec^2 60^\circ \tan 45^\circ} \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

$$\frac{(2)^2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + (2)^2}{\sqrt{3} \times (\sqrt{2})^2 - (2)^2 \times 1}$$

$$\frac{2 \cdot 4 \times \frac{1}{2} + 4}{2\sqrt{3} - 4}$$

$$\frac{6}{2\sqrt{3}-4} \Rightarrow \frac{\cancel{6}^3}{\cancel{2}(\sqrt{3}-2)}$$

$$\frac{3}{\sqrt{3}-2} \times \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}+2}$$

$$\frac{3(\sqrt{3}+2)}{3-4}$$

$$-3(\sqrt{3}+2)$$

Q) If $\tan(A+B) = \sqrt{3}$ & $\tan(A-B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $0^\circ < (A+B) < 90^\circ$,

$A > B$, then the values of A and B are.... respectively.

यदि $\tan(A+B) = \sqrt{3}$ & $\tan(A-B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $0^\circ < (A+B) < 90^\circ$, $A > B$,
तो A और B के मान क्रमशः _____ हैं।

$$A+B = 60^\circ, \quad A-B = 30^\circ$$

$$A = \frac{\cancel{90}}{\cancel{2}}, \quad B = \frac{\cancel{30}}{\cancel{2}}$$

$$45^\circ \text{ \& \& } 15^\circ$$

Q) If $\tan \theta_1 = 1$, $\sin \theta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ then the value of $\sin(\theta_1 + \theta_2)$ equal to:

यदि $\tan \theta_1 = 1$, $\sin \theta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ तो $\sin(\theta_1 + \theta_2)$ का मान किसके बराबर है?

$$\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = 45^\circ$$

$$\sin(45^\circ + 45^\circ)$$

$$\sin 90^\circ = 1$$

RADIAN रेडियन

$a^\circ = a \text{ Degree}$

$a^c = a \text{ radian}$

$$\boxed{1^\circ = 57.296^c}$$

$$\pi = 3.14^\circ = 3.14 \times 57.296^c$$

$$= 179.9 \approx 180^\circ$$

$$\boxed{\pi = 180^\circ}$$

$$\boxed{360^\circ = 2\pi}$$

$$180^\circ = \pi$$

$$1^\circ = \frac{\pi^c}{180}$$

$$\boxed{n^\circ = \left(\frac{\pi}{180} \times n \right)^c}$$

$$90^\circ \rightarrow \frac{\pi}{2 \times 180} \times 90 = \frac{\pi}{2}$$

$$45^\circ \rightarrow \frac{\pi}{4 \times 180} \times 45 = \frac{\pi}{4}$$

$$30^\circ = \frac{\pi}{6 \times 180} \times 30 = \frac{\pi}{6}$$

$$60^\circ = \frac{\pi}{3 \times 180} \times 60 = \frac{\pi}{3}$$

Q) $\frac{4}{3} \cot^2 \left(\frac{\pi}{6} \right)^{30^\circ} + 3 \cos^2 150^\circ - 4 \operatorname{cosec}^2 45^\circ + 8 \sin \frac{\pi}{2}$

$\frac{4}{3} \times (\sqrt{3})^2 + 3 \cos^2 (180-30) - 4 \times (\sqrt{2})^2 + 8 \times 1$

$\frac{4}{3} \times 3 + 3 \times \cos^2 30^\circ - 4 \times 2 + 8$

$4 + 3 \times \frac{3}{4} - 8 + 8$

$4 + \frac{9}{4} = \frac{25}{4}$

Q) The value of $32 \cot^2 \frac{\pi}{4} - 8 \sec^2 \frac{\pi}{3} + 8 \cos^3 \frac{\pi}{6}$ is equal to:

$32 \cot^2 \left(\frac{\pi}{4} \right)^{45} - 8 \sec^2 \left(\frac{\pi}{3} \right)^{60} + 8 \cos^3 \left(\frac{\pi}{6} \right)^{30}$ का मान बराबर है।

$32 \times 1 - 8 \times (2)^2 + 8 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3$

$32 - 32 + 8 \times \frac{3\sqrt{3}}{8}$

$3\sqrt{3}$

Q) If $A = \frac{\pi}{6}$ and $B = \frac{\pi}{3}$ then which of the following is/are correct?

यदि $A = \frac{\pi}{6}^{30^\circ}$ और $B = \frac{\pi}{3}^{60^\circ}$, तो निम्नलिखित में से कौनसा/से सही है/हैं?

I. $\sin A + \sin B = \cos A + \cos B \Rightarrow \sin 30^\circ + \sin 60^\circ = \cos 30^\circ + \cos 60^\circ$

II. $\tan A + \tan B = \cot A + \cot B \Rightarrow \tan 30^\circ + \tan 60^\circ = \cot 30^\circ + \cot 60^\circ$

Both 1 and 2

Q) If $\cos \theta \geq \frac{1}{2}$ in the first quadrant then which one of the following is correct?

यदि पहले चतुर्थांश में $\cos \theta \geq \frac{1}{2}$ हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है।

$90^\circ < \theta < 0^\circ$

↳ Ist Quadrant

$$\cos \theta \geq \frac{1}{2}$$

$$\theta \geq 60^\circ$$

$$\theta \geq \frac{\pi}{3}$$

Q) Consider the following :

(i) $\sin 1^\circ > \sin 1^\circ$ (ii) $\cos 1^\circ < \cos 1^\circ$ (iii) $\tan 1^\circ > \tan 1^\circ$


Which of the above are not correct?

निम्नलिखित पर विचार कीजिये:


(i) $\sin 1^\circ > \sin 1^\circ$ (ii) $\cos 1^\circ < \cos 1^\circ$ (iii) $\tan 1^\circ > \tan 1^\circ$

उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है।

(i) $\sin 1^\circ > \sin 1^\circ$ $\hookrightarrow 57.296^\circ$ $1^\circ \approx 57.296^\circ$



(ii) $\cos 1^\circ < \cos 1^\circ$ $\hookrightarrow 57.296^\circ$



(iii) $\tan 1^\circ > \tan 1^\circ$ $\hookrightarrow 57.296^\circ$



I, II and III

Q) Consider the following statements:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1) The first quadrant contains only one value of x which satisfies $\sin x + \cos x = 2$.

प्रथम चतुर्थांश में x का केवल वही मान है जो $\sin x + \cos x = 2$ को संतुष्ट करता है।

$$0^\circ < \theta < 90^\circ$$

$$\sin x + \cos x = 2$$

2) The first quadrant contains only one value of x which satisfies $\sin x - \cos x = 0$

प्रथम चतुर्थांश में x का केवल एक मान है जो $\sin x - \cos x = 0$ को संतुष्ट करता है।

$$\sin x - \cos x = 0$$

$$\sin x = \cos x$$

$$x = 45^\circ \Rightarrow \sin x = \cos x$$

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Which of the above is /are correct?

2 only

1. If $x \sin 45^\circ = y \operatorname{cosec} 30^\circ$, then $\frac{x^2}{y^2}$ is equal to

यदि $x \sin 45^\circ = y \operatorname{cosec} 30^\circ$, तो $\frac{x^2}{y^2}$ बराबर है

- (a) 4^3
- (b) 6^3
- (c) 2^3
- (d) 8^3

2. If $x \cos^2 30^\circ \cdot \sin 60^\circ = \frac{\tan^2 45^\circ \cdot \sec 60^\circ}{\operatorname{cosec} 60^\circ}$ then the value of x.

यदि $x \cos^2 30^\circ \cdot \sin 60^\circ = \frac{\tan^2 45^\circ \cdot \sec 60^\circ}{\operatorname{cosec} 60^\circ}$ तो x का मान।

- (a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- (b) $2\frac{2}{3}$
- (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{1}{2}$

3. Find the value of $\operatorname{cosec}(-1410^\circ)$

$\operatorname{cosec}(-1410^\circ)$ का मान ज्ञात कीजिए

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 7
- (d) 2

4. $2\cos^2 135^\circ + \sin 150^\circ + \frac{1}{2}\cos 180^\circ + \tan 135^\circ$

- (a) 0
- (b) 2
- (c) 1
- (d) 3

5. Find the value of $\sin^2 200^\circ + \sin^2 250^\circ + \sin^2 280^\circ + \sin^2 370^\circ$

$\sin^2 200^\circ + \sin^2 250^\circ + \sin^2 280^\circ + \sin^2 370^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 6

6. $\sin^2 \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{3} - \tan^2 \frac{\pi}{4}$

- (a) $\frac{-1}{2}$
- (b) 2
- (c) -2
- (d) $\frac{1}{2}$

7. $2\sin^2 \frac{3\pi}{4} + 2\cos^2 \frac{\pi}{4} + 2\sec^2 \frac{\pi}{3}$

- (a) 8
(b) 10
(c) 6
(d) 0

8. $2\sin^2 \frac{\pi}{6} - \operatorname{cosec}^2 \frac{7\pi}{6} \cos^2 \frac{\pi}{3}$

- (a) $-\frac{1}{2}$
(b) $\frac{7}{2}$
(c) $\frac{5}{2}$
(d) $\frac{3}{2}$

9. $\frac{5\sin^2 30^\circ + \cos^2 45^\circ - 4\tan^2 30^\circ}{2\sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ + \tan 45^\circ} = ?$

- (a) $\frac{5}{6(\sqrt{3}+2)}$
(b) $5 - \sqrt{3}$
(c) $\sqrt{3} - 2$
(d) $\frac{\sqrt{3}-2}{6}$

10. If $\cot \theta = \frac{1}{2}$ & θ is acute angle, the value of $\frac{8\sin \theta + 5\cos \theta}{\sin^3 \theta + 2\cos^3 \theta + 3\cos \theta}$ is यदि $\cot \theta = \frac{1}{2}$ और θ न्यूनकोण है, तो $\frac{8\sin \theta + 5\cos \theta}{\sin^3 \theta + 2\cos^3 \theta + 3\cos \theta}$ का मान है

- (a) $\frac{23}{5}$
(b) $\frac{21}{5}$
(c) $\frac{21}{5\sqrt{5}}$
(d) $\frac{23\sqrt{5}}{5}$

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	D	A	A	A	B	A	A	B

Worksheet solution

Sol 1

$$x \sin 45^\circ = y \operatorname{cosec} 30^\circ$$

$$x \times \frac{1}{\sqrt{2}} = y \times 2$$

$$x = 2\sqrt{2}y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{2\sqrt{2}}{1}$$

$$\frac{x^2}{y^2} = \frac{8}{1} = 2^3$$

Sol 2

$$x \cos^2 30^\circ \cdot \sin 60^\circ = \frac{\tan^2 45^\circ \sec 60^\circ}{\operatorname{cosec} 60^\circ}$$

$$x \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} =$$

$$\frac{(1)^2 \times 2}{\frac{2}{\sqrt{3}}}$$

$$x \times \frac{3}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 \times \sqrt{3}$$

$$x = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

Sol 3

$$\operatorname{cosec}(-141^\circ)$$

$$= \operatorname{cosec}[4 \times 360^\circ - 30^\circ]$$

$$= \operatorname{cosec}[-30^\circ]$$

$$\operatorname{cosec} 30^\circ = 2 \checkmark$$

Sol 4

$$2 \cos^2 135^\circ + \sin 150^\circ +$$

$$\frac{1}{2} \cos 180^\circ + \tan 135^\circ$$

$$2 \left[\cos^2 (90^\circ + 45^\circ) + \sin (90^\circ + 60^\circ) + \frac{1}{2} \cos 180^\circ + \tan (90^\circ + 45^\circ) \right]$$

$$2 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(-1) + (-1) = 0$$

Sol 5

$$\sin^2 200^\circ + \sin^2 250^\circ + \sin^2 280^\circ + \sin^2 370^\circ$$

$$\sin^2 (180^\circ + 20^\circ) + \sin^2 (270^\circ - 20^\circ) + \sin^2 (270^\circ + 10^\circ) + \sin^2 (360^\circ + 10^\circ)$$

$$\sin^2 20^\circ + \cos^2 20^\circ + \cos^2 10^\circ + \sin^2 10^\circ$$

$$1 + 1 = 2 \quad (\because \sin^2 x + \cos^2 x = 1)$$

Sol-6

$$\sin^2 \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{3} + \tan^2 \frac{\pi}{4}$$

$$\sin^2 30^\circ + \cos^2 60^\circ + \tan^2 45^\circ$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + (1)^2$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{2}$$

Sol-7

$$2 \sin^2 \frac{3\pi}{4} + 2 \cos^2 \frac{\pi}{4} + 2 \sec^2 \frac{\pi}{3}$$

$$2 \sin^2 135^\circ + 2 \cos^2 45^\circ + 2 \sec^2 60^\circ$$

$$2 \sin^2 45^\circ + 2 \cos^2 45^\circ + 2 \sec^2 60^\circ$$

$$2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2 \times (2)^2$$

$$= 10$$

Sol-8

$$2 \sin^2 \frac{\pi}{6} - \operatorname{cosec}^2 \frac{7\pi}{6} \cdot \cos^2 \frac{\pi}{3}$$

$$2 \sin^2 30^\circ - \operatorname{cosec}^2 210^\circ \times \cos^2 60^\circ$$

$$2 \sin^2 30^\circ - (-\operatorname{cosec}^2 30^\circ) \times \cos^2 60^\circ$$

$$2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 - (-2)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$2 \times \frac{1}{4} - 4 \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$$

Sol-9

$$5 \sin^2 30^\circ + \cos^2 45^\circ - 4 \tan^2 30^\circ$$

$$2 \sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ + 4 \tan 45^\circ$$

$$5 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - 4 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$$

$$\frac{5}{4} + \frac{1}{2} - \frac{4}{3}$$


$$= \frac{\sqrt{3} + 2}{2}$$

$$\frac{15 + 6 - 16}{12}$$

$$= \frac{\sqrt{3} + 2}{2}$$

$$= \frac{5}{6(\sqrt{3} + 2)}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{2}$$



$$\frac{8 \sin \theta + 5 \cos \theta}{\sin^3 \theta + 2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta}$$

$$= \frac{8 \times \frac{2}{\sqrt{5}} + 5 \times \frac{1}{\sqrt{5}}}{\frac{8}{5\sqrt{5}} + \frac{2 \times 1}{5\sqrt{5}} + \frac{3}{\sqrt{5}}} = \frac{21}{5}$$

TRIGONOMETRY

Q) If $\frac{\cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 2}{\sin^2 \theta} = 1$, where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, then which of the following statements is / are correct?

यदि $\frac{\cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 2}{\sin^2 \theta} = 1$, जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, तो निम्नलिखित में से

कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. There are two values of θ satisfying the above equations.

उपरोक्त समीकरणों को संतुष्ट करने वाले θ के दो मान हैं।

2. $\theta = 60^\circ$ is satisfied the above equation. Select the correct answer using the code given below.

$\theta = 60^\circ$ उपरोक्त समीकरण से संतुष्ट है।

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 2 &= \sin^2 \theta \\ \cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 2 &= 1 - \cos^2 \theta \\ 2 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 1 &= 0 \\ 2 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta - \cos \theta + 1 &= 0 \\ 2 \cos \theta (\cos \theta - 1) - 1 (\cos \theta - 1) &= 0 \\ (\cos \theta - 1) (2 \cos \theta - 1) &= 0 \\ \boxed{\cos \theta = 1} & \quad \boxed{\cos \theta = 1/2} \\ \theta = 0^\circ & \quad \theta = 60^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ \sin^2 \theta &= 1 - \cos^2 \theta \end{aligned}$$

Select the correct answer using the code given below.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

a. 1 only / केवल 1


☒ b. 2 only / केवल 2

c. Both 1 and 2 / दोनों 1 और 2

d. Neither 1 nor 2 / न तो 1 और न ही 2

Q) If $\sin \theta = \frac{7}{25}$, then the value of $\cos \theta$ and $\tan \theta$ respectively are (Where θ - in - first - Quadrant)


यदि $\sin \theta = \frac{7}{25}$ है, तो $\cos \theta$ और $\tan \theta$ के मान क्रमशः हैं। (जहाँ θ प्रथम चतुर्थांश में है)



$$\cos \theta = \frac{24}{25}, \tan \theta = \frac{7}{24}$$

Q) If $\sin \theta = \left(\frac{9}{41}\right)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ then what is the value of $\cot \theta$?


यदि $\sin \theta = \left(\frac{9}{41}\right)$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ तो $\cot \theta$ का मान क्या होगा?



$$\cot \theta = \frac{40}{9}$$

Q) If $\sin \theta = \frac{2xy}{x^2+y^2}$, then find the value of $\tan \theta$


यदि $\sin \theta = \frac{2xy}{x^2+y^2}$ तो $\tan \theta$ का मान है।



$$\tan \theta = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$$

Q) If given that $\sin \theta = \frac{15}{17}$, find the value of $\frac{15 \cot \theta + 17 \sin \theta}{8 \tan \theta + 16 \sec \theta}$, where $0^\circ < \theta < 90^\circ$ is.

यदि $\sin \theta = \frac{15}{17}$ दिया गया है, $\frac{15 \cot \theta + 17 \sin \theta}{8 \tan \theta + 16 \sec \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है।




$$\frac{15 \times \frac{8}{15} + 17 \times \frac{15}{17}}{8 \times \frac{15}{8} + 16 \times \frac{17}{8}}$$

$$\frac{8 + 15}{15 + 34} = \frac{23}{49}$$

Q) If $\sin \theta = \frac{12}{13}$, $0 < \theta < 90^\circ$, then $\frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{2 \sin \theta \cdot \cos \theta} \times \frac{1}{\tan^2 \theta} = \dots$

यदि $\sin \theta = \frac{12}{13}$, $0 < \theta < 90^\circ$ है तो $\frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{2 \sin \theta \cdot \cos \theta} \times \frac{1}{\tan^2 \theta} = \dots$



$$\frac{\frac{144}{169} - \frac{25}{169}}{2 \times \frac{12}{13} \times \frac{5}{13}} \times \frac{25}{144}$$

$$\frac{\frac{119}{169}}{\frac{120}{169}} \times \frac{25}{144}$$

$$\frac{119}{120} \times \frac{25}{144}$$


$$\frac{595}{3456}$$

Q) If $\sec \theta = \frac{13}{5}$ and $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ then find $\cot \theta$?

यदि $\sec \theta = \frac{13}{5}$ और $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ तो $\cot \theta$ का मान ज्ञात कीजिये?

$$270^\circ < \theta < 360^\circ$$

IVth Quadrant.



$$\cot \theta = \frac{5}{12}$$

$$\text{IV}^{\text{th}} \text{ Quadrant} \Rightarrow -\frac{5}{12}$$

Q) If $\frac{\sin^2 \theta}{\tan^2 \theta - \sin^2 \theta} = 5$, θ is an acute angle, then the value

of $\frac{24 \sin^2 \theta - 15 \sec^2 \theta}{6 \operatorname{cosec}^2 \theta - 7 \cot^2 \theta}$ is:

यदि $\frac{\sin^2 \theta}{\tan^2 \theta - \sin^2 \theta} = 5$ है, θ न्यून कोण है, तो $\frac{24 \sin^2 \theta - 15 \sec^2 \theta}{6 \operatorname{cosec}^2 \theta - 7 \cot^2 \theta}$ का मान ज्ञात करें।


$$\sin^2 \theta = 5 \tan^2 \theta - 5 \sin^2 \theta$$

$$6 \sin^2 \theta = 5 \tan^2 \theta$$

$$6 \sin^2 \theta = 5 \times \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}$$


$$\boxed{\cos^2 \theta = \frac{5}{6}}$$

$$\boxed{\cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}}$$



$$\frac{24 \times \frac{1}{6} - 15 \times \frac{6}{5}}{6 \times \frac{6}{1} - 7 \times \frac{5}{1}} = \frac{4 - 18}{36 - 35} = \frac{-14}{1}$$

Q) If $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$ where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ then $\frac{(6 \tan \theta)(1 + \tan \theta)^{-1}}{(1 - \tan \theta)}$ is equal to?
 यदि $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$ जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ तो $\frac{(6 \tan \theta)(1 + \tan \theta)^{-1}}{(1 - \tan \theta)}$ किसके बराबर है?



$$\frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{9}}$$

$$\frac{2}{4} \times 9 = \frac{9}{4} = 2.25$$

$$\frac{6 \tan \theta}{(1 - \tan \theta)(1 + \tan \theta)} = \frac{6 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

* PROPERTIES :-

$$x = \sqrt{a \sqrt{a \sqrt{a \sqrt{a \dots \infty}}}}$$


$$\boxed{x = a}$$

Q) If $\cos \theta = \sqrt{\frac{1}{7}} \sqrt{\frac{1}{7}} \sqrt{\frac{1}{7}} \dots \infty$ ($\theta \neq 0^\circ$, θ is acute angle), then

find $\tan \theta + \cot \theta = ?$

यदि $\cos \theta = \sqrt{\frac{1}{7}} \sqrt{\frac{1}{7}} \sqrt{\frac{1}{7}} \dots \infty$ ($\theta \neq 0^\circ$, θ न्यूनकोण है), तो $\tan \theta + \cot \theta$ ज्ञात कीजिए?

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{7}}$$




$$\frac{\sqrt{48}}{1} + \frac{1}{\sqrt{48}}$$

$$\frac{48+1}{\sqrt{48}} = \frac{49}{\sqrt{48}}$$

Q) If $\cot \theta = \frac{1}{2}$ & θ is acute angle, the value of $\frac{8 \sin \theta + 5 \cos \theta}{\sin^3 \theta + 2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta}$ is

यदि $\cot \theta = \frac{1}{2}$ और θ न्यूनकोण है, तो $\frac{8 \sin \theta + 5 \cos \theta}{\sin^3 \theta + 2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta}$ का मान है?



$$8 \times \frac{2}{\sqrt{5}} + 5 \times \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^3 + 2\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^3 + 3 \times \frac{1}{\sqrt{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}}(16+5)}$$

$$\frac{\frac{8}{5\sqrt{5}} + 2 \times \frac{1}{5\sqrt{5}} + \frac{3}{\sqrt{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}}(16+5)}$$

$$\frac{\frac{8}{5\sqrt{5}} + \frac{2}{5\sqrt{5}} + \frac{3}{\sqrt{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}}(16+5)}$$

$$(\sqrt{a})^3 = a\sqrt{a}$$


$$\frac{\frac{1}{\sqrt{5}}(21)}{\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{8}{5} + \frac{2}{5} + 3\right)} = \frac{21}{\frac{21}{5} + 3}$$

$$\frac{21}{5}$$

Q) If $\frac{\sin \theta}{a} = \frac{\cos \theta}{b}$, then find $\operatorname{cosec} \theta$?

यदि $\frac{\sin \theta}{a} = \frac{\cos \theta}{b}$, तो $\operatorname{cosec} \theta$ ज्ञात कीजिये?


$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{a}{b} \Rightarrow \boxed{\tan \theta = \frac{a}{b}}$$



$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

Q) If $\sin 23^\circ = \frac{p}{q}$ then $\sec 23^\circ - \sin 67^\circ = ?$

यदि $\sin 23^\circ = \frac{p}{q}$ तो $\sec 23^\circ - \sin 67^\circ = ?$




$$\frac{q}{\sqrt{q^2 - p^2}} - \frac{\sqrt{q^2 - p^2}}{q}$$

$$\frac{q^2 - (q^2 - p^2)}{q \sqrt{q^2 - p^2}} = \frac{q^2 - q^2 + p^2}{q \sqrt{q^2 - p^2}} = \frac{p^2}{q \sqrt{q^2 - p^2}}$$

Q) If $\tan \theta = \frac{\sqrt{q^2 - p^2}}{p}$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then what is the value of

$$\sec \theta + \cos \theta + 2?$$

यदि $\tan \theta = \frac{\sqrt{q^2 - p^2}}{p}$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, तब $\sec \theta + \cos \theta + 2$ का मान क्या होगा?



$$\frac{q}{p} + \frac{p}{q} + 2$$

$$\frac{q^2 + p^2}{pq} + 2$$

$$\frac{q^2 + p^2 + 2pq}{pq} = \frac{(q+p)^2}{pq}$$

TRIGONOMETRIC IDENTITIES

1) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

$$\begin{cases} \cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta \\ \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta \end{cases}$$

2) $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$

$$\hookrightarrow \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$$

$$\hookrightarrow \tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$$


$$\hookrightarrow (\sec \theta + \tan \theta)(\sec \theta - \tan \theta) = 1$$

$$\hookrightarrow \boxed{\sec \theta + \tan \theta = \frac{1}{\sec \theta - \tan \theta}}$$

Ex:-

$$\begin{aligned} \sec \theta + \tan \theta &= 3 \\ + \sec \theta - \tan \theta &= \frac{1}{3} \\ \hline 2 \sec \theta &= 3 + \frac{1}{3} \\ 2 \sec \theta &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\sec \theta = \frac{5}{3}}$$



3) $\boxed{\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1}$

$$\hookrightarrow \operatorname{cosec}^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta$$

$$\hookrightarrow \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta - 1$$

$$\hookrightarrow \boxed{(\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta) = \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta}}$$

Q) If $\sec \theta - \operatorname{cosec} \theta = 0$, then what will be the value of $(\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta)$?
 यदि $\sec \theta - \operatorname{cosec} \theta = 0$ हो, तो $(\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta)$ का मान कितना होगा?

$$\boxed{\sec \theta = \operatorname{cosec} \theta}$$

$$\theta = 45^\circ$$

$$(\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta)$$

$$\sec 45^\circ + \operatorname{cosec} 45^\circ$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

$$2\sqrt{2}$$

Q) If $p \sin \theta = \sqrt{3}$ and $p \cos \theta = 1$, then what will be the value of p ?

यदि $p \sin \theta = \sqrt{3}$ तथा $p \cos \theta = 1$ हो, तो p का मान कितना होगा?

$$p^2 \sin^2 \theta = 3 \quad p^2 \cos^2 \theta = 1$$

+

$$p^2 \sin^2 \theta + p^2 \cos^2 \theta = 4$$

$$p^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 4$$

$$p^2 \times 1 = 4$$

$$p = \sqrt{4} = 2$$

Q) If $5 \tan \theta = 4$, then what will be the value of $\left(\frac{5 \sin \theta - 3 \cos \theta}{5 \sin \theta + 3 \cos \theta} \right)$

यदि $5 \tan \theta = 4$ हो, तो $\left(\frac{5 \sin \theta - 3 \cos \theta}{5 \sin \theta + 3 \cos \theta} \right)$ का मान क्या होगा ?

$$\boxed{\tan \theta = \frac{4}{5}}$$

$$\frac{\cos \theta \left[5 \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - 3 \right]}{\cos \theta \left[5 \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + 3 \right]}$$

$$\frac{5 \tan \theta - 3}{5 \tan \theta + 3}$$

$$\frac{5 \times \frac{4}{5} - 3}{5 \times \frac{4}{5} + 3} = \frac{1}{7}$$

Q) If $\sec \theta + \tan \theta = \sqrt{3}$ then the positive value of $\sin \theta$ is -


यदि $\sec \theta + \tan \theta = \sqrt{3}$ तो $\sin \theta$ का धनात्मक मान है -

$$\sec \theta + \tan \theta = \sqrt{3}$$

$$\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$+ \quad \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\hline 2 \sec \theta = \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{4}{\sqrt{3}}$$



$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$

Q) If $\sec \theta + \tan \theta = 2$, then what will be the value of $\sec \theta$?

यदि $\sec \theta + \tan \theta = 2$ हो, तो $\sec \theta$ का मान क्या होगा ?

$$\begin{aligned} \sec \theta + \tan \theta &= 2 \\ \sec \theta - \tan \theta &= \frac{1}{2} \\ + \\ \hline 2 \sec \theta &= 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$\sec \theta = \frac{5}{4}$$

Q) If $7 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta = 4$ ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$) then what will be the value of θ ?

यदि $7 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta = 4$ ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$) हो, तो θ का मान कितना होगा?

By option $\frac{\pi}{6} = 30^\circ = 7 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{3}{4}$

$$\frac{7}{4} + \frac{9}{4} = \frac{16}{4} \text{ (4)}$$

Method

$$7 \sin^2 \theta + 3 (1 - \sin^2 \theta) = 4$$

$$7 \sin^2 \theta + 3 - 3 \sin^2 \theta = 4$$

$$4 \sin^2 \theta = 1$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = 30^\circ \rightarrow \frac{\pi}{6}$$

1. $\sin \theta = \frac{4}{5}$, find $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\tan \theta + \cot \theta}$

(a) $\frac{84}{125}$

(b) $\frac{25}{84}$

(c) $\frac{33}{125}$

(d) $\frac{64}{125}$

2. $\cos \theta = \frac{3}{5}$, find $\frac{2\sin \theta + 3\cos \theta}{\tan \theta - \cot \theta}$

(a) $\frac{105}{35}$

(b) $\frac{109}{22}$

(c) $\frac{204}{35}$

(d) $\frac{203}{35}$

3. $\tan \theta = \frac{4}{3}$, find $\frac{1+2\sin \theta + 3\cos \theta}{1+3\sin \theta - 2\cos \theta}$

(a) $\frac{265}{34}$

(b) $\frac{34}{265}$

(c) $\frac{39}{24}$

(d) 2

4. If $\cot \theta = \frac{8}{15}$, then what is the value of $\sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}}$ where, θ is a positive acute angle?

यदि $\cot \theta = \frac{8}{15}$, तो $\sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}}$ where, θ का मान क्या है, जहाँ θ एक धनात्मक न्यून कोण है?

(a) $\frac{1}{5}$

(b) $\frac{2}{5}$

(c) $\frac{3}{5}$

(d) $\frac{4}{5}$

5. If $\cos A = \frac{5}{13}$, then what is the value of $\frac{\sin A - \cot A}{2\tan A}$?

यदि $\cos A = \frac{5}{13}$, तो $\frac{\sin A - \cot A}{2\tan A}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{395}{3644}$

(b) $\frac{395}{3844}$

(c) $\frac{395}{3744}$

(d) $\frac{385}{3744}$

6. If θ lies in the first quadrant and $\cot \theta = \frac{63}{16}$, then what is the value of $(\sin \theta + \cos \theta)$?

यदि θ प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तथा $\cot \theta = \frac{63}{16}$ है, तो $(\sin \theta + \cos \theta)$ का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) $\frac{69}{65}$
- (c) $\frac{79}{65}$
- (d) 2

7. If $0 < \theta < 90^\circ$, $\sin \theta = \frac{3}{5}$ and $x = \cot \theta$, then what is the value of $1 + 3x + 9x^2 + 27x^3 + 81x^4 + 243x^5$?

यदि $0 < \theta < 90^\circ$, $\sin \theta = \frac{3}{5}$ तथा $x = \cot \theta$ है, तो $1 + 3x + 9x^2 + 27x^3 + 81x^4 + 243x^5$ का मान क्या है?

- (a) 941
- (b) 1000
- (c) 1220
- (d) 1365

8. If $\operatorname{cosec} \theta = \frac{p}{q}$ and θ is acute, then what is the value of $(\sqrt{p^2 - q^2}) \tan \theta$?

यदि $\operatorname{cosec} \theta = \frac{p}{q}$ तथा θ न्यूनकोण है, तो $(\sqrt{p^2 - q^2}) \tan \theta$ का मान क्या है?

- (a) p
- (b) q
- (c) pq
- (d) $\sqrt{p^2} + q^2$

9. If $\tan \theta = \frac{p}{q}$, then what is $\frac{p \sec \theta - q \operatorname{cosec} \theta}{p \sec \theta + q \operatorname{cosec} \theta}$ equal to?

यदि $\tan \theta = \frac{p}{q}$, तो $\frac{p \sec \theta - q \operatorname{cosec} \theta}{p \sec \theta + q \operatorname{cosec} \theta}$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{p-q}{p+q}$
- (b) $\frac{q^2-p^2}{q^2+p^2}$
- (c) $\frac{p^2-q^2}{q^2+p^2}$
- (d) 1

10. If $\sin 17^\circ = \frac{x}{y}$ then the value of $(\sec 17^\circ - \sin 73^\circ)$ is

यदि $\sin 17^\circ = \frac{x}{y}$ तो $(\sec 17^\circ - \sin 73^\circ)$ का मान है

(a) $\frac{y^2}{x\sqrt{y^2-x^2}}$

(b) $\frac{x^2}{y\sqrt{y^2-x^2}}$

(c) $\frac{x^2}{y\sqrt{x^2-y^2}}$

(d) $\frac{y^2}{x\sqrt{x^2-y^2}}$

11. If $\sin \theta = \frac{p^2-1}{p^2+1}$, then $\cos \theta$ is equal to:

यदि $\sin \theta = \frac{p^2-1}{p^2+1}$ है, तो $\cos \theta$ बराबर है :

(a) $\frac{2p}{1+p^2}$

(b) $\frac{p}{p^2-1}$

(c) $\frac{p}{1+p^2}$

(d) $\frac{2p}{p^2-1}$

12. If यदि $\sin \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of $\sec \theta + \tan \theta$ is:

यदि $\sin \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, तो $\sec \theta + \tan \theta$ का मान है:

(a) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{b}$

(b) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}+b}{2a}$

(c) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2b}$

(d) $\frac{\sqrt{a^2+b^2}+b}{a}$


ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	C	D	C	C	C	D	B	C	B	A	A

Worksheet solution

sol 1

$$\sin \theta = \frac{4}{5}$$




$$= \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\tan \theta + \cot \theta}$$

$$= \frac{\frac{4}{5} + \frac{3}{5}}{\frac{4}{3} + \frac{3}{4}} = \frac{84}{125}$$

sol 2

$$\cos \theta = \frac{3}{5}$$




$$= \frac{2 \sin \theta + 3 \cos \theta}{\tan \theta - \cot \theta}$$

$$= \frac{2 \times \frac{4}{5} + 3 \times \frac{3}{5}}{\frac{4}{3} - \frac{3}{4}}$$

$$= \frac{204}{35}$$

sol 3

$$\tan \theta = \frac{4}{3}$$




$$= \frac{1 + 2 \sin \theta + 3 \cos \theta}{1 + 3 \sin \theta - 2 \cos \theta}$$

$$= \frac{1 + 2 \times \frac{4}{5} + 3 \times \frac{3}{5}}{1 + 3 \times \frac{4}{5} - 2 \times \frac{3}{5}}$$

$$= \frac{22}{11} = 2$$

sol 4

$$\cot \theta = \frac{8}{15}$$




$$= \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{8}{17}}{1 + \frac{8}{17}}}$$

$$= \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$$

sol 5

$$\cos A = \frac{5}{13}$$




$$= \frac{\sin A - \cot A}{2 + \tan A} = \frac{\frac{12}{13} - \frac{5}{12}}{2 \times \frac{12}{5}}$$

$$= \frac{144 - 65}{13 \times 12 \times 2 \times \frac{12}{5}} = \frac{395}{3744}$$

sol-6 $\cot \theta = \frac{63}{16}$


Pythagorean triplet (65, 63, 16)



$$\begin{aligned} &= \sin \theta + \cos \theta \\ &= \frac{16}{65} + \frac{63}{65} = \frac{79}{65} \end{aligned}$$

sol 7

$\sin \theta = \frac{3}{5}$



$\therefore \cot \theta = x = \frac{4}{3}$


$$= 1 + 3x + 9x^2 + 27x^3 + 81x^4 + 243x^5$$

$$= 1 + 3 \times \frac{4}{3} + 9 \times \frac{16}{9} + 27 \times \frac{64}{27} + 81 \times \frac{256}{81} + 243 \times \frac{1024}{243}$$

$$= 1 + 4 + 16 + 64 + 256 + 1024 = 1365$$


sol 8

$\operatorname{cosec} \theta = \frac{p}{q}$



$$= (\sqrt{p^2 - q^2}) \times \frac{q}{\sqrt{p^2 - q^2}} = q$$


sol-9 $\tan \theta = \frac{p}{q}$



$$\begin{aligned} &= \frac{p \sec \theta - q \operatorname{cosec} \theta}{p \sec \theta + q \operatorname{cosec} \theta} \\ &= \frac{p \left(\frac{\sqrt{p^2 + q^2}}{q} \right) - q \left(\frac{\sqrt{p^2 + q^2}}{p} \right)}{p \left(\frac{\sqrt{p^2 + q^2}}{q} \right) + q \left(\frac{\sqrt{p^2 + q^2}}{p} \right)} \\ &= \frac{\frac{p}{q} - \frac{q}{p}}{\frac{p}{q} + \frac{q}{p}} = \frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2} \end{aligned}$$

sol 10

$\sin 17^\circ = \frac{x}{y}$



$$\begin{aligned} &= \sec 17^\circ - \sin 73^\circ \\ &= \sec 17^\circ - \sin(90^\circ - 17^\circ) \\ &= \sec 17^\circ - \cos 17^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{y}{\sqrt{y^2 - x^2}} - \frac{\sqrt{y^2 - x^2}}{x} \\ &= \frac{x^2}{y \sqrt{y^2 - x^2}} \end{aligned}$$


$$\boxed{\text{sol-11}} \quad \sin \theta = \frac{p^2 - 1}{p^2 + 1}$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos \theta &= \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{\frac{(p^2 + 1)^2 - (p^2 - 1)^2}{(p^2 + 1)^2}} \\ &= \sqrt{1 - \frac{(p^2 - 1)^2}{(p^2 + 1)^2}} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{\frac{4p^2}{(p^2 + 1)^2}} \left[\because (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \right]$$

$$= \frac{2p}{p^2 + 1}$$

$$\boxed{\text{sol-12}} \quad \sin \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



$$\therefore \sec \theta + \tan \theta$$

$$= \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{b} + \frac{a}{b}$$

$$= \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{b}$$

TRIGONOMETRY

$$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$


$$\sec \theta + \tan \theta = \frac{1}{\sec \theta - \tan \theta}$$

$\sec \theta + \tan \theta = k$

$$\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{k}$$

$$+ \quad \frac{2 \sec \theta = k + \frac{1}{k} = \frac{k^2 + 1}{k}}$$

$$\boxed{\sec \theta = \frac{k^2 + 1}{2k}}$$



$$P^2 = (k^2 + 1)^2 - (2k)^2$$

$$P^2 = k^4 + 1 + 2k^2 - 4k^2$$

$$k^4 + 1 - 2k^2$$


$$P^2 = (k^2 - 1)^2$$

$$P = \boxed{k^2 - 1}$$

Ex:-

$$\sec \theta + \tan \theta = 3 \rightarrow (K)$$

$$\sin \theta = ?$$




$$\sin \theta = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

Ex:-

$$\operatorname{Cosec} \theta + \cot \theta = 4 \rightarrow (k)$$

$$\cos \theta = ?$$



$$\cos \theta = \frac{8}{17}$$

SPECIAL CASE



$$\overset{+}{\sec} \theta - \overset{-}{\tan} \theta = 3 \rightarrow (k)$$

$$\overset{+}{\sec} \theta + \overset{-}{\tan} \theta = \frac{1}{3}$$

$$2 \tan \theta = \frac{1}{3} - 3$$

$$2 \tan \theta = -\frac{8}{3}$$

$\tan \theta = -\frac{4}{3}$




$$\sin \theta = -\frac{4}{5}$$

Q) If $\sec \theta = x + \frac{1}{4x}$ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$), then what will be $\sec \theta + \tan \theta$ equal to?

यदि $\sec \theta = x + \frac{1}{4x}$ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) हों, तो $\sec \theta + \tan \theta$ किसके बराबर होगा?

Put, $x=1$

$$\sec \theta = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$



$$\sec \theta + \tan \theta$$

$$\frac{5}{4} + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} \quad (2)$$

$$2x = 2$$


Q) If $\sec \theta + \tan \theta = 2 + \sqrt{5}$, then what will be the value of $\sin \theta + \cos \theta$?

यदि $\sec \theta + \tan \theta = 2 + \sqrt{5}$ हो, तो $\sin \theta + \cos \theta$ का मान क्या होगा?

$$\sec \theta + \tan \theta = \sqrt{5} + 2$$

$$\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{5} + 2} \times \frac{\sqrt{5} - 2}{\sqrt{5} - 2}$$

$$\frac{2\sec \theta = 2\sqrt{5}}{\boxed{\sec \theta = \sqrt{5}}} \quad \frac{\sqrt{5} - 2}{5 - 4} = \sqrt{5} - 2$$



$$\frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{3}{\sqrt{5}}$$

Q) The numerical value of $\frac{1}{1 + \cot^2 \theta} + \frac{3}{1 + \tan^2 \theta} + 2 \sin^2 \theta$ is :

$\frac{1}{1 + \cot^2 \theta} + \frac{3}{1 + \tan^2 \theta} + 2 \sin^2 \theta$ का संख्यात्मक मान होगा।

$$\frac{1}{\operatorname{cosec}^2 \theta} + \frac{3}{\sec^2 \theta} + 2 \sin^2 \theta$$

$$\sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta$$

$$3 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta$$

$$3 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$$

$$3 \times 1 = 3$$

IInd Method

Value Putting

$$\theta = 45^\circ$$

$$\frac{1}{1+1} + \frac{3}{1+1} + 2 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 2 \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{2+4}{2} + 1 = 3$$

{ θ की कोई भी Value रख सकते हैं। }

{ $\left[\frac{1}{0}, \frac{0}{1} \right]$ की form नहीं बननी चाहिए }

Q) The value of $\frac{4}{1+\tan^2 \alpha} + \frac{1}{1+\cot^2 \alpha} + 3 \sin^2 \alpha$ is

$\frac{4}{1+\tan^2 \alpha} + \frac{1}{1+\cot^2 \alpha} + 3 \sin^2 \alpha$ का मान है।

$$\theta = 45^\circ$$

$$\frac{4}{1+1} + \frac{1}{1+1} + 3 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$\frac{4}{2} + \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

IInd Method

$$\frac{4}{\sec^2 \theta} + \frac{1}{\operatorname{cosec}^2 \theta} + 3 \sin^2 \theta$$

$$4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + 3 \sin^2 \theta$$

$$4 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)$$

$$4 \times 1 = 4$$

Q) If $4x = \sec \theta$ and If $\frac{4}{x} = \tan \theta$, then what will be $8(x^2 - \frac{1}{x^2})$?

यदि $4x = \sec \theta$ तथा $\frac{4}{x} = \tan \theta$ हो, तो $8(x^2 - \frac{1}{x^2})$ क्या होगा?

$$x = \frac{\sec \theta}{4}, \quad \frac{1}{x} = \frac{\tan \theta}{4}$$

$$x^2 - \frac{1}{x^2} = \left(\frac{\sec^2 \theta}{16} - \frac{\tan^2 \theta}{16} \right)$$

$$\frac{1}{16} (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)$$


$$\frac{1}{16} \times 1 = \frac{1}{16}$$

$$8(x^2 - \frac{1}{x^2})$$

$$8 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{2}$$

Q) If $\sec \theta + \tan \theta = 5$, then what will be the value of $\frac{\tan \theta + 1}{\tan \theta - 1}$?

यदि $\sec \theta + \tan \theta = 5$, तो $\frac{\tan \theta + 1}{\tan \theta - 1}$ का मान क्या होगा?



$$\frac{\frac{24}{10} + 1}{\frac{24}{10} - 1} \Rightarrow \frac{\frac{34}{10}}{\frac{14}{10}}$$

$$\frac{34}{14} = \frac{17}{7}$$

Q) What is the numerical value of $1 + \frac{1}{\cot^2 63^\circ} - \sec^2 27^\circ + \frac{1}{\sin^2 63^\circ} - \operatorname{cosec}^2 27^\circ$

$1 + \frac{1}{\cot^2 63^\circ} - \sec^2 27^\circ + \frac{1}{\sin^2 63^\circ} - \operatorname{cosec}^2 27^\circ$ का संख्यात्मक मान बताइए :

$$1 + \tan^2 63^\circ - \sec^2 27^\circ + \operatorname{cosec}^2 63^\circ - \operatorname{cosec}^2 27^\circ$$

$$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$$

$$\sec^2 (90 - 63) \qquad \qquad \operatorname{cosec}^2 (90 - 63)$$

$$\cancel{\sec^2 63^\circ} - \cancel{\operatorname{cosec}^2 63^\circ} + \cancel{\operatorname{cosec}^2 63^\circ} - \cancel{\sec^2 63^\circ}$$

$$= 0$$

Q) If θ be an acute angle and $7 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta = 4$, then the value of $\tan \theta$ is

यदि θ एक न्यूनकोण हो और $7 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta = 4$ हो, तो $\tan \theta$ का मान है ?

$$7 \sin^2 \theta + 3(1 - \sin^2 \theta) = 4$$

$$7 \sin^2 \theta + 3 - 3 \sin^2 \theta = 4$$

$$4 \sin^2 \theta = 1$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{1}{4}} = +\frac{1}{2}$$

$$\boxed{\theta = 30^\circ}$$

$$\tan \theta$$

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Q) If $\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = \frac{7}{12}$, then $\sec^4 \theta - \tan^4 \theta = ?$

यदि $\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = \frac{7}{12}$, तो $\sec^4 \theta - \tan^4 \theta = ?$

$$\sec^4 \theta - \tan^4 \theta$$

$$(\sec^2 \theta + \tan^2 \theta) (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)$$

$$\frac{7}{12} \times 1$$

$$\frac{7}{12}$$

Q) If $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \cos \theta$, then $\sin \theta - \cos \theta = ?$

यदि $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \cos \theta$, तो $(\sin \theta - \cos \theta) = ?$

$$(\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \cos \theta)^2$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \cos^2 \theta$$

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \cos^2 \theta$$

$$\boxed{2 \sin \theta \cos \theta = 2 \cos^2 \theta - 1}$$

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$1 - (2 \cos^2 \theta - 1)$$

$$1 - 2 \cos^2 \theta + 1 = 2 - 2 \cos^2 \theta$$

$$2(1 - \cos^2 \theta)$$

$$2 \sin^2 \theta$$

$$\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2 \sin^2 \theta}$$

$$\pm 2 \sin \theta$$

Q) $\sqrt{\frac{1}{\sin^4(90+A)} + \frac{1}{\cos^2(90+A)-1}} = ?$

$$= \sqrt{\frac{1}{\cos^4 A} + \frac{1}{\sin^2 A - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\cos^4 A} + \frac{1}{-\cos^2 A}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\cos^2 A} \left[\frac{1}{\cos^2 A} - 1 \right]}$$

$$= \frac{1}{\cos A} \sqrt{\frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}}$$

$$= \frac{1}{\cos A} \sqrt{\tan^2 A}$$

$$\sec A \times \tan A$$

$$\begin{cases} 1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta \\ \sin^2 \theta - 1 = -\cos^2 \theta \end{cases}$$

Q) $a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x = c^2$

$$2 \sin^2 x - \cos^2 x = ?$$

$$a^2 \sin^2 x + b^2 (1 - \sin^2 x) = c^2$$

$$a^2 \sin^2 x + b^2 - b^2 \sin^2 x = c^2$$

$$\sin^2 x (a^2 - b^2) = c^2 - b^2$$

$$\boxed{\sin^2 x = \frac{c^2 - b^2}{a^2 - b^2}}$$

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x \Rightarrow 1 - \frac{c^2 - b^2}{a^2 - b^2}$$

$$\frac{a^2 - \cancel{b^2} - c^2 + \cancel{b^2}}{a^2 - b^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2 - b^2}$$

$$2 \sin^2 x - \cos^2 x$$

$$2 \left(\frac{c^2 - b^2}{a^2 - b^2} \right) - \frac{a^2 - c^2}{a^2 - b^2}$$

$$\frac{2c^2 - 2b^2 - a^2 + c^2}{a^2 - b^2}$$

$$\frac{3c^2 - 2b^2 - a^2}{a^2 - b^2}$$

1. What is the least value of $9\sin^2\theta + 16\cos^2\theta$?

$9\sin^2\theta + 16\cos^2\theta$ का न्यूनतम मान क्या है?

- (a) 0
- (b) 9
- (c) 16
- (d) 25

2. If $\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta = m$ and $\sec\theta - \cos\theta = n$, then what is

$m^{\frac{4}{3}}n^{\frac{2}{3}} + m^{\frac{2}{3}}n^{\frac{4}{3}}$ equal to?

यदि $\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta = m$ तथा $\sec\theta - \cos\theta = n$, तो $m^{\frac{4}{3}}n^{\frac{2}{3}} + m^{\frac{2}{3}}n^{\frac{4}{3}}$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) mn
- (d) m^2n^2

3. $\frac{\cos^2\theta}{1-\tan\theta} + \frac{\sin^3\theta}{\sin\theta - \cos\theta} = ?$

- (a) $1 - \sin\theta\cos\theta$
- (b) $1 + \sin\theta\cos\theta$
- (c) $1 + \sin\theta$
- (d) None of these

4. What will be the value of $(1 + \sin^4 A - \cos^4 A)\operatorname{cosec}^2 A$?

$(1 + \sin^4 A - \cos^4 A)\operatorname{cosec}^2 A$ का मान क्या होगा?

- (a) -2
- (o) 2
- (c) -1
- (d) 1

5. Find the value of $\frac{\operatorname{cosec}\theta}{\operatorname{cosec}\theta - 1} + \frac{\operatorname{cosec}\theta}{\operatorname{cosec}\theta + 1} - \tan^2\theta, 0^\circ < \theta < 90^\circ$.

$\frac{\operatorname{cosec}\theta}{\operatorname{cosec}\theta - 1} + \frac{\operatorname{cosec}\theta}{\operatorname{cosec}\theta + 1} - \tan^2\theta, 0^\circ < \theta < 90^\circ$, का मान ज्ञात करें।

- (a) $2\sec^2\theta$
- (b) $\sec^2\theta + 1$
- (c) $\sec^2\theta$
- (d) $1 - \tan^2\theta$

6. If $x + y = 90^\circ$, then what is $\sqrt{\cos x \operatorname{cosec} y - \cos x \sin y}$ equal to?

[illegible]

Worksheet solution

sol 1

$$\begin{aligned}y &= 9\sin^2\theta + 16\cos^2\theta \\&= 9(\sin^2\theta + \cos^2\theta) + 7\cos^2\theta \\&= 9 + 7(0) = 9\end{aligned}$$

sol 2

$$m = \operatorname{cosec}\theta - \sin\theta = \frac{1 - \sin^2\theta}{\sin\theta} = \frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}$$

$$n = \sec\theta - \cos\theta = \frac{1 - \cos^2\theta}{\cos\theta} = \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}$$

$$m^{\frac{4}{3}} \cdot n^{\frac{2}{3}} + m^{\frac{2}{3}} \cdot n^{\frac{4}{3}} = (m \cdot n)^{\frac{2}{3}} \cdot \{m^{\frac{2}{3}} + n^{\frac{2}{3}}\}$$

$$= \left(\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta} \cdot \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta} \right)^{\frac{2}{3}} \cdot \left\{ \left(\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta} \right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta} \right)^{\frac{2}{3}} \right\}$$

$$= (\sin\theta \cdot \cos\theta)^{\frac{2}{3}} \cdot \left\{ \frac{(\cos^3\theta)^{\frac{2}{3}} + (\sin^3\theta)^{\frac{2}{3}}}{(\sin\theta \cdot \cos\theta)^{\frac{2}{3}}} \right\}$$

$$= (\sin\theta \cdot \cos\theta)^{\frac{2}{3}} \cdot \left\{ \frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta}{(\sin\theta \cdot \cos\theta)^{\frac{2}{3}}} \right\}$$

$$= 1$$

sol 3

$$= \frac{\cos^2\theta}{1 - \tan\theta} + \frac{\sin^3\theta}{\sin\theta - \cos\theta}$$

$$= \frac{\cos^2\theta}{1 - \frac{\sin\theta}{\cos\theta}} + \frac{\sin^3\theta}{\sin\theta - \cos\theta}$$

$$= \frac{\cos^3\theta}{\cos\theta - \sin\theta} + \frac{\sin^3\theta}{\cos\theta - \sin\theta}$$

$$= \frac{[\cos \theta - \sin \theta] [\cos^2 \theta + \sin^2 \theta + \cos \theta \sin \theta]}{(\cos \theta - \sin \theta)}$$

$$= 1 + \cos \theta \sin \theta$$

sol 4

$$= (1 + \sin^4 A - \cos^4 A) \operatorname{cosec}^2 A$$

$$= [1 + (\sin^2 A)^2 - (\cos^2 A)^2] \operatorname{cosec}^2 A$$

$$= [1 + (\sin^2 A - \cos^2 A)(\sin^2 A + \cos^2 A)] \operatorname{cosec}^2 A$$

$$= [1 + \sin^2 A - \cos^2 A] \operatorname{cosec}^2 A$$

$$= 2 \sin^2 A \times \operatorname{cosec}^2 A = 2$$

sol 5

$$= \frac{\operatorname{cosec} \theta}{\operatorname{cosec} \theta - 1} + \frac{\operatorname{cosec} \theta}{\operatorname{cosec} \theta + 1} - \tan^2 \theta$$

$$= \frac{\operatorname{cosec} \theta \theta (\operatorname{cosec} \theta + 1 + \operatorname{cosec} \theta - 1)}{(\operatorname{cosec} \theta - 1)(\operatorname{cosec} \theta + 1)} - \tan^2 \theta$$

$$= \frac{\operatorname{cosec} \theta : 2 \operatorname{cosec} \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1} - \tan^2 \theta$$

$$= \frac{2 \operatorname{cosec}^2 \theta}{\cot^2 \theta} - \tan^2 \theta$$

$$= 2 \times \frac{1}{\sin^2 \theta} \times \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} - \tan^2 \theta$$

$$= 2 \sec^2 \theta - \tan^2 \theta$$

$$= \sec^2 \theta + (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)$$

$$= \sec^2 \theta + 1$$

sol 6

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\cos x \operatorname{cosec} y - \cos x \sin y} \quad (\because x+y=90^\circ) \\ &= \sqrt{\cos x \cdot \operatorname{cosec}(90^\circ-x) - \cos x \cdot \sin(90^\circ-x)} \\ &= \sqrt{\cos x \cdot \sec x - \cos^2 x} \\ &= \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{\sin^2 x} = \sin x \end{aligned}$$

sol 7

$$\begin{aligned} &= \frac{[1 - \tan(90^\circ - \theta) + \sec(90^\circ - \theta)]}{[\tan(90^\circ - \theta) + \sec(90^\circ - \theta) + 1]} \\ &= \frac{1 - \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta}{\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta + 1} \\ &= \frac{(\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta) + (\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta + 1} \\ &= \frac{(\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)(\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta) + (\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta + 1} \\ &= \frac{(\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)(\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta + 1)}{\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta + 1} \\ &= \operatorname{cosec} \theta - \cot \theta \\ &= \frac{1}{\sin \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2}} \\ &= \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} = \tan \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

sol 8

$$p = \cot \theta + \tan \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta}$$

$$q = \sec \theta - \cos \theta = \frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta = \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta}$$

$$= (p^2 q)^{\frac{2}{3}} - (q^2 p)^{\frac{2}{3}}$$

$$= \left(\frac{1}{\sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta} \times \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} \right)^{\frac{2}{3}} - \left(\frac{\sin^4 \theta}{\cos^2 \theta} \times \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$= \left(\frac{1}{\cos^3 \theta} \right)^{\frac{2}{3}} - \left(\frac{\sin^3 \theta}{\cos^3 \theta} \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 \theta} - \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = 1$$

sol 9

(I) R.H.S $\cos^2 \theta (1 + \tan \theta)(1 - \tan \theta)$

$$= \cos^2 \theta (1 - \tan^2 \theta)$$

$$= \cos^2 \theta \left(\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \right)$$

$$= \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \text{L.H.S}$$

(II)

L.H.S $\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} \times \frac{(1 + \sin \theta)}{(1 - \sin \theta)}$

$$= \frac{(1 + \sin \theta)^2}{1 - \sin^2 \theta} = \left(\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} \right)^2$$

$$= (\sec \theta + \tan \theta)^2$$

option (C) Both (i) and (ii)

Sol 10

$$\Rightarrow \tan^2 \theta - 3 \sec \theta + 3 = 0$$

$$\Rightarrow \sec^2 \theta - 1 - 3 \sec \theta + 3 = 0$$

$$\Rightarrow \sec^2 \theta - 3 \sec \theta + 2 = 0$$

$$\Rightarrow \sec^2 \theta - 2 \sec \theta - \sec \theta + 2 = 0$$

$$\Rightarrow \sec \theta (\sec \theta - 2) - 1 (\sec \theta - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (\sec \theta - 1) (\sec \theta - 2) = 0$$

$$\sec \theta = 2 \quad \sec \theta \neq 1 \quad (0^\circ < \theta < 90^\circ)$$

$$\sec \theta = 2 \Rightarrow \sec \theta = \sec 60^\circ$$

$$\theta = 60^\circ$$

$$= (\sin \theta + \cot \theta)$$

$$= \sin 60^\circ + \cot 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{3+2}{2\sqrt{3}} = \frac{5}{2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{6}$$

TRIGONOMETRY

$$\bullet a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 + b^2 - ab)$$

$$\bullet a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + b^2 + ab)$$

Q) What is $(\sin^2 x - \cos^2 x)(1 - \sin^2 x \cos^2 x)$ equal to ?

$(\sin^2 x - \cos^2 x)(1 - \sin^2 x \cos^2 x)$ किसके बराबर है ?

$$(\sin^2 x - \cos^2 x)((\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - \sin^2 x \cos^2 x)$$

$$(\sin^4 x + \cos^4 x + 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x - \sin^2 x \cos^2 x)$$

$$(\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cdot \cos^2 x)$$

$$(\sin^2 x)^3 - (\cos^2 x)^3$$

$$\sin^6 x - \cos^6 x$$

Q) Consider the following equations:

निम्नलिखित समीकरणों पर विचार करें:

I. $\operatorname{cosec}^2 x + \sec^2 x = \operatorname{cosec}^2 x \sec^2 x$

II. $\sec^2 x + \tan^2 x = \sec^2 x \tan^2 x$

III. $\operatorname{cosec}^2 x + \tan^2 x = \cot^2 x + \sec^2 x$

Which of the above statements are correct?

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं ?

a) I and II

b) II and III

☒ c) I and III

d) All of these

☒ I. $\operatorname{cosec}^2 x + \sec^2 x = \operatorname{cosec}^2 x \sec^2 x$

$$\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$$

$$\frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$$

$$= \operatorname{cosec}^2 x \cdot \sec^2 x$$

II) $\sec^2 x + \tan^2 x = \sec^2 x \tan^2 x$

$$\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}$$

$$\frac{1 + \sin^2 x}{\cos^2 x}$$

III) $\operatorname{cosec}^2 x + \tan^2 x = \cot^2 x + \sec^2 x$

$$1 + \cot^2 x + \sec^2 x - 1$$

$$\cot^2 x + \sec^2 x$$

$$\therefore \sec^2 x - \tan^2 x = 1$$

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

Q) If $\sin^2 \alpha = \cos^3 \alpha$, then the value of $(\cot^6 \alpha - \cot^2 \alpha)$ is -

यदि $\sin^2 \alpha = \cos^3 \alpha$, तो $(\cot^6 \alpha - \cot^2 \alpha)$ का मान है -

$$\sin^2 \alpha = \cos \alpha \cos^2 \alpha \quad \cot^2 \alpha (\cot^4 \alpha - 1)$$

$$\frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha}$$

$$\cot^2 \alpha (\sec^2 \alpha - 1)$$

$$\cot^2 \alpha \cdot \tan^2 \alpha$$

$$= 1$$

$$\boxed{\cot^2 \alpha = \sec \alpha}$$

$$\cot^4 \alpha = \sec^2 \alpha$$

Q) If $a^2 = \frac{1+2\sin\theta\cos\theta}{1-2\sin\theta\cos\theta}$, then what is the value of $\frac{a+1}{a-1}$?

यदि $a^2 = \frac{1+2\sin\theta\cos\theta}{1-2\sin\theta\cos\theta}$ है, तो $\frac{a+1}{a-1}$ का मान क्या है ?

$$\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2\sin\theta\cos\theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2\sin\theta\cos\theta}$$

$$a^2 = \frac{(\sin\theta + \cos\theta)^2}{(\sin\theta - \cos\theta)^2}$$

$$\boxed{\frac{a}{1} = \frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - \cos\theta}}$$

$$\frac{a+1}{a-1} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta$$

$$\bullet (a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2$$

$$\bullet (a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3a^2b + 3ab^2$$

Q) If $\sin \theta + \sin^2 \theta = 1$, then what is the value of $\cos^{12} \theta + 3\cos^{10} \theta + 3\cos^8 \theta + \cos^6 \theta - 1$?

यदि $\sin \theta + \sin^2 \theta = 1$ हो, तो $\cos^{12} \theta + 3\cos^{10} \theta + 3\cos^8 \theta + \cos^6 \theta - 1$ का मान क्या होगा?

$$\sin \theta = 1 - \sin^2 \theta$$

$$\boxed{\sin \theta = \cos^2 \theta}$$

$$\boxed{\sin^2 \theta = \cos^4 \theta}$$

$$[(\cos^4 \theta)^3 + (\cos^2 \theta)^3 + 3\cos^8 \theta \cdot \cos^2 \theta + 3 \times \cos^4 \theta \times \cos^4 \theta] - 1$$

$$[\cos^4 \theta + \cos^2 \theta]^3 - 1$$

$$[\sin^2 \theta + \cos^2 \theta]^3 - 1$$

$$1 - 1 = 0$$

Q) If $\cos A = 1 - \sin^2 (90^\circ - A)$, then $\sin^{12} A + 3\sin^{10} A + 3\sin^8 A + \sin^6 A + 2\sin^4 A + 2\sin^2 A - 2 = ?$

यदि $\cos A = 1 - \sin^2 (90^\circ - A)$, तो $\sin^{12} A + 3\sin^{10} A + 3\sin^8 A + \sin^6 A + 2\sin^4 A + 2\sin^2 A - 2 = ?$

$$\cos A = 1 - \cos^2 A$$

$$\boxed{\cos A = \sin^2 A}$$

$$\cos^2 A = \sin^4 A$$

$$[\sin^4 A + \sin^2 A]^3 + 2[\sin^4 A + \sin^2 A - 1]$$

$$[\cos^2 A + \sin^2 A]^3 + 2[\cos^2 A + \sin^2 A - 1]$$

$$1^3 + 2(1 - 1)$$

$$1 + 2 \times 0 = 1$$

$\boxed{\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 2}$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{\theta = 90^\circ}$$

$$\boxed{\sin^n \theta + \operatorname{cosec}^n \theta = 2}$$

$\boxed{\cos \theta + \sec \theta = 2}$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{\theta = 0}$$

$$\boxed{\cos^n \theta + \sec^n \theta = 2}$$

$\boxed{\tan \theta + \cot \theta = 2}$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{\theta = 45^\circ}$$

$$\boxed{\tan^n \theta + \cot^n \theta = 2}$$

Q) If $\cos \theta + \sec \theta = 2$, the value of $\cos^6 \theta + \sec^6 \theta$ is :

यदि $\cos \theta + \sec \theta = 2$, तो $\cos^6 \theta + \sec^6 \theta$ का मान है :

$$\boxed{\theta = 0^\circ}$$

$$\frac{11}{2}$$

Q) If $\sin \theta + \csc \theta = 2$, then what is the value of $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$?

यदि $\sin \theta + \csc \theta = 2$ है, तो $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$ का मान क्या है ?

$$\boxed{\theta = 90^\circ}$$

$$\sin^4 90^\circ + \cos^4 90^\circ$$

$$1 + 0$$

$$1$$

Q) If θ is an acute angle and $\tan \theta + \cot \theta = 2$, then find the value of $\tan^3 \theta + \cot^3 \theta + 6 \tan^3 \theta \cdot \cot^2 \theta$

यदि θ एक न्यूनकोण है और $\tan \theta + \cot \theta = 2$ है, तो $\tan^3 \theta + \cot^3 \theta + 6 \tan^3 \theta \cdot \cot^2 \theta$ का मान ज्ञात कीजिए

$$\tan^3 \theta + \cot^3 \theta + 6 \tan^3 \theta \cdot \cot^2 \theta$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$1$$

$$1$$

$$6 \times 1 \times 1$$

$$1 + 1 + 6$$

$$8$$

$$\boxed{\theta = 45^\circ}$$

Q) If $\sin \theta + \csc \theta = 2$, then what will be the value of $\sin^n \theta + \csc^n \theta$?

यदि $\sin \theta + \csc \theta = 2$ हो, तो $\sin^n \theta + \csc^n \theta$ का मान क्या होगा ?

$$\frac{11}{2}$$

Q) If $\cos \theta + \sec \theta = 2$, then $(\cos^{17} \theta + \sec^{17} \theta)$ is equal to :

यदि $\cos \theta + \sec \theta = 2$ है, तो $(\cos^{17} \theta + \sec^{17} \theta)$ बराबर है :

$$\frac{11}{2}$$

Q) If θ is an acute angle and $\cot \theta + \tan \theta = 2$ then find the value of $\tan^{12} \theta + \cot^{12} \theta + 2 \tan^5 \theta \cot^7 \theta$.

यदि θ एक न्यून कोण है और $\cot \theta + \tan \theta = 2$ है तो $\tan^{12} \theta + \cot^{12} \theta + 2 \tan^5 \theta \cot^7 \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$1 + 1 + 2 \times 1 \times 1$$

$$1 + 1 + 2$$

$$4$$

$$\boxed{\theta = 45^\circ}$$

#

- $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

- $\boxed{B \rightarrow (-B)}$ $\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$

- $\boxed{A \rightarrow (90+A)}$ $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

- $\boxed{B \rightarrow (-B)}$ $\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$

- $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$

- $\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$

- $\cot(A+B) = \frac{\cot A \cot B - 1}{\cot B + \cot A}$

- $\cot(A-B) = \frac{\cot A \cot B + 1}{\cot B - \cot A}$

Q) Find the value of $\sin 15^\circ$.

$\sin 15^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$\sin(15^\circ) = \sin(45^\circ - 30^\circ)$$

$$\sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}$$


$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right]$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2} \right)$$



$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{\sin(90+A+B)}{\cos(A+B)}$$

- $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$



$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{8 - (\sqrt{3}-1)^2}}{\sqrt{8 - (3+1-2\sqrt{3})}} \\ & \frac{\sqrt{8 - (4-2\sqrt{3})}}{\sqrt{8-4+2\sqrt{3}}} \\ & \frac{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}{\sqrt{4+2\sqrt{3}}} = 1 \end{aligned}$$



- $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$



- $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$

- $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$

$$\begin{aligned} \tan 15^\circ &= \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} \times \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} \\ &= \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{3-1} = \frac{4-2\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{2(2-\sqrt{3})}{2} \end{aligned}$$

$$\tan 15^\circ = 2-\sqrt{3}$$

Q) Find the value of $\tan 75^\circ$
 $\tan 75^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।



$$\begin{aligned}\tan 75^\circ &= \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1} = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{3-1} \\ &= \frac{4+2\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{2(2+\sqrt{3})}{2} \\ &= (2+\sqrt{3})\end{aligned}$$

I	II	III

1. For $0^\circ < \theta < 90^\circ$, $\tan \theta + \cot \theta = 2$ then θ is equal to:

$0^\circ < \theta < 90^\circ$, के लिए $\tan \theta + \cot \theta = 2$ तो θ बराबर है :

- (a) 30°
- (b) 60°
- (c) 45°
- (d) 0°

2. If $\tan A + \cot A = 2$, then $\tan 3A + \cot 3A = ?$

यदि $\tan A + \cot A = 2$ है, तो $\tan 3A + \cot 3A = ?$

- (A) -2
- (B) 1
- (C) 0
- (D) 3

3. If $\cos \theta + \sec \theta = 2$, then find the value of $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$.

यदि $\cos \theta + \sec \theta = 2$ है, तो $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{3}$
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 2

4. Find the value of $\sin 25^\circ \cos 35^\circ + \cos 25^\circ \sin 35^\circ$.

$\sin 25^\circ \cos 35^\circ + \cos 25^\circ \sin 35^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (c) 1
- (d) $\frac{1}{2}$

5. If $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$, and $\sec^{107} \theta + \cos^{107} \theta = 2$, then, $(\sec \theta + \cos \theta)$ is equal to:

यदि $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ और $\sec^{107} \theta + \cos^{107} \theta = 2$ है, तो $(\sec \theta + \cos \theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2^{-107}
- (b) 2
- (c) $1/2$
- (d) 1

6. If $\tan \theta + \cot \theta = 2$, θ is an acute angle, then find the value of $2\tan^{25} \theta + 3\cot^{20} \theta + 5\tan^{30} \theta \cot^{15} \theta$.

यदि $\tan \theta + \cot \theta = 2$ है, θ एक न्यून कोण है, तो $2\tan^{25} \theta + 3\cot^{20} \theta + 5\tan^{30} \theta \cot^{15} \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

- a. 12
- b. 10
- c. 8
- d. 6

7. If $\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 2$, then what is the value of $(\sin^{153} \theta + \operatorname{cosec}^{253} \theta)$?

यदि $\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 2$ है, तो $(\sin^{153} \theta + \operatorname{cosec}^{253} \theta)$ का मान है?

- (a) $\frac{1}{153 \times 253}$
 (b) $\frac{253}{153}$
 (c) 2
 (d) $\frac{153}{253}$

8. If $\sin(A + B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ and $\tan(A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$, then $(2A + 3B)$ is equal to:

यदि $\sin(A + B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ और $\tan(A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ तो $(2A + 3B)$ बराबर है:

- (a) 120°
 (b) 135°
 (c) 130°
 (d) 125°

9. What is the value of $\frac{\sin(A+B)}{\sin A \cos B}$?

$\frac{\sin(A+B)}{\sin A \cos B}$ का मान क्या है?

- (a) $1 + \cot A \tan B$
 (b) $1 + \tan A \cot B$
 (c) $1 - \sin A \cos B$
 (d) $1 - \cot A \tan B$

10. Using trigonometric formulas, find the value of

$$\left(\frac{\sin(x-y)}{\sin(x+y)} \right) \left(\frac{\tan x + \tan y}{\tan x - \tan y} \right).$$

त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके $\left(\frac{\sin(x-y)}{\sin(x+y)} \right) \left(\frac{\tan x + \tan y}{\tan x - \tan y} \right)$ का मान ज्ञात करें।

करें।

- (a) -2
 (b) 2
 (c) 0
 (d) 1

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	B	A	B	B	C	B	A	D

Worksheet solution

sol 1

$$\tan \theta + \cot \theta = 2$$

$$\therefore \theta = 45^\circ \quad (\text{Property})$$

sol 2

$$\tan A + \cot A = 2 \quad (\because A = 45^\circ)$$

$$\tan 3A + \cot 3A = ?$$

$$\tan 3 \times 45 + \cot 3 \times 45$$

$$\tan 135^\circ + \cot 135^\circ = -2$$

sol 3

$$\cos \theta + \sec \theta = 2$$

$$\theta = 0^\circ$$

$$= \sin^6 \theta + \cos^6 \theta$$

$$= \sin^6 0^\circ + \cos^6 0^\circ$$

$$= 0 + (1)^6 = 1$$

sol 4

$$\sin A \cdot \cos B + \cos A \cdot \sin B = \sin(A+B)$$

$$\sin 25^\circ \cos 35^\circ + \cos 25^\circ \sin 35^\circ = \sin(25^\circ + 35^\circ)$$

$$= \sin 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}$$

sol 5

$$\sec^{107} \theta + \cos^{107} \theta = 2$$

$$\theta = 0^\circ$$

$$(\because \sec^n \theta + \cos^n \theta = 2)$$

$$= \sec \theta + \cos \theta$$

$$= \sec 0^\circ + \cos 0^\circ$$

$$= 1 + 1 = 2$$

Sol-6

$$\tan \theta + \cot \theta = 2$$

$$\theta = 45^\circ$$

$$\begin{aligned} &= 2 \tan^{25} \theta + 3 \cot^{20} \theta + 5 \tan^{30} \theta \cot^{15} \theta \\ &= 2 \tan^{25} 45^\circ + 3 \cot^{20} 45^\circ + 5 \tan^{30} 45^\circ \cot^{15} 45^\circ \\ &= 2 (1)^{25} + 3 (1)^{20} + 5 (1)^{30} \cdot (1)^{15} \\ &= 2 + 3 + 5 = 10 \end{aligned}$$

Sol-7

$$\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 2$$

$$\theta = 90^\circ$$

$$\begin{aligned} &= \sin^{153} \theta + \operatorname{cosec}^{253} \theta \\ &= \sin^{153} 90^\circ + \operatorname{cosec}^{253} 90^\circ \\ &= (1)^{153} + (1)^{253} = 2 \end{aligned}$$

Sol-8

$$\sin(A+B) = \frac{\sqrt{3}}{2}, (A+B) = 60^\circ \dots (i)$$

$$\tan(A-B) = \frac{1}{\sqrt{3}}, (A-B) = 30^\circ \dots (ii)$$

$$A+B = 60^\circ$$

$$A-B = 30^\circ$$

$$\hline 2A = 90^\circ$$

$$A = 45^\circ, B = 15^\circ$$

$$\therefore (2A+3B) = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$$

Sol-9

$$\frac{\sin(A+B)}{\sin A \cos B}$$

$$= \frac{\sin A \cdot \cos B + \cos A \cdot \sin B}{\sin A \cdot \cos B}$$

$$= 1 + \cot A \tan B$$

Sol 10

$$= \left(\frac{\sin(x-y)}{\sin(x+y)} \right) \times \left[\frac{\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin y}{\cos y}}{\frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\sin y}{\cos y}} \right]$$

$$= \frac{\sin(x-y)}{\sin(x+y)} \times \frac{\frac{\sin x \cdot \cos y + \sin y \cos x}{\cos x \cos y}}{\frac{\sin x \cos y - \sin y \cos x}{\cos x \cos y}}$$


$$= \frac{\sin(x-y)}{\sin(x+y)} \times \frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)}$$

$$= 1$$

TRIGONOMETRY

Q) What is the value of $\sin 75^\circ + \sin 15^\circ$?

$\sin 75^\circ + \sin 15^\circ$ का मान क्या है?



$$\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{\sqrt{3}+1+\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\boxed{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}}$$

Q) $\sin\left(\underbrace{\frac{\pi}{4}-A}_A\right) \sin\left(\underbrace{\frac{\pi}{4}-B}_B\right) - \cos\left(\underbrace{\frac{\pi}{4}-A}_A\right) \cos\left(\underbrace{\frac{\pi}{4}-B}_B\right) = ?$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$- \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}-A\right) \cos\left(\frac{\pi}{4}-B\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}-A\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}-B\right) \right]$$

$$= -\cos\left(\frac{\pi}{4}-A + \frac{\pi}{4}-B\right)$$

$$= -\cos\left[\frac{\pi}{2} - (A+B)\right]$$

$$= \sin(A+B)$$

Q) What is the value of $[(\sin 59^\circ \cos 31^\circ + \cos 59^\circ \sin 31^\circ) \div (\cos 20^\circ \cos 25^\circ - \sin 20^\circ \sin 25^\circ)]$?

$[(\sin 59^\circ \cos 31^\circ + \cos 59^\circ \sin 31^\circ) \div (\cos 20^\circ \cos 25^\circ - \sin 20^\circ \sin 25^\circ)]$ का मान क्या है?

$$[\sin(59+31)] \div [\cos(20+25)]$$

$$\sin 90 \div \cos 45^\circ$$

$$1 \div \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow 1 \times \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

Q) If $\tan A = \frac{15}{8}$ and $\tan B = \frac{7}{24}$, then $\tan(A+B)$?

यदि $\tan A = \frac{15}{8}$ तथा $\tan B = \frac{7}{24}$ है, तो $\tan(A+B)$?

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

$$\frac{\frac{3}{3} \times \frac{15}{8} + \frac{7}{24}}{1 - \frac{15}{8} \times \frac{7}{24}} = \frac{\frac{52}{24}}{\frac{64-35}{64}}$$

$$\frac{52 \times 64}{24 \times 29} = \frac{416}{87}$$

Q) $\cos(90-A) \cdot \sin[\pi - (A-B)] + \sin(90-A) \cos[\pi - (B-A)] = ?$

$$\sin A \cdot \sin(A-B) + \cos A \cdot -\cos(B-A)$$

$$\sin A \cdot \sin(A-B) - \cos A \cdot \cos(A-B)$$

$$\therefore \cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$- [\cos A \cos(A-B) - \sin A \sin(A-B)]$$

$$- \cos(A+A-B)$$

$$- \cos(2A-B)$$

Q) $\cos(90-A) \cdot \sin[\pi + (A-B)] + \sin(90-A) \cos[\pi - (B-A)] = ?$

$$\sin A - \sin(A-B) + \cos A \cdot -\cos(B-A)$$

$$- \sin A \cdot \sin(A-B) - \cos A \cdot \cos(A-B)$$

$$\therefore \cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

$$- [\cos A \cos(A-B) + \sin A \sin(A-B)]$$

$$- [\cos(A-A+B)]$$

$$- \cos B$$

If $A + B = 90^\circ$

$A = 90 - B$

$\hookrightarrow \sin A = \sin(90 - B)$

$\sin A = \cos B$

$\hookrightarrow \sin A = \frac{1}{\sec B}$

$\sin A \cdot \sec B = 1$

$\hookrightarrow \frac{1}{\operatorname{cosec} A} = \cos B$

$\operatorname{cosec} A \cdot \cos B = 1$

$\hookrightarrow \tan A = \tan(90 - B)$

$\tan A = \cot B$

$\hookrightarrow \tan A = \frac{1}{\tan B}$

$\tan A \cdot \tan B = 1$

$\hookrightarrow \frac{1}{\cot A} = \cot B$

$\cot A \cdot \cot B = 1$

$\hookrightarrow \sec A = \sec(90 - B)$

$\sec A = \operatorname{cosec} B$

$\hookrightarrow \sin^2 A + \sin^2 B = 1$

$\hookrightarrow \cos^2 A + \cos^2 B = 1$

Ex:- $\sin 3x \cdot \sec 2x = 1$

$x = ?$

$5x = 90^\circ$

$x = 18^\circ$

Q) If $\tan(x+y) \tan(x-y) = 1$, then what will be the value of $\tan\left(\frac{2x}{3}\right)$?

यदि $\tan(x+y) \tan(x-y) = 1$, हो, तो $\tan\left(\frac{2x}{3}\right)$ का मान क्या होगा?

$$\therefore \tan A \cdot \tan B = 1$$

$$A + B = 90^\circ$$

$$x + y + x - y = 90$$

$$\boxed{2x = 90^\circ}$$

$$\tan\left(\frac{2x}{3}\right) = \tan\left(\frac{90^\circ}{3}\right)$$

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Q) What will be the value of $\frac{\sin 39^\circ}{\cos 51^\circ} + 2 \tan 11^\circ \tan 31^\circ \tan 45^\circ \tan 59^\circ \tan 79^\circ - 3(\sin^2 21^\circ + \sin^2 69^\circ)$

$$\frac{\sin 39^\circ}{\cos 51^\circ} + 2 \tan 11^\circ \tan 31^\circ \tan 45^\circ \tan 59^\circ \tan 79^\circ - 3(\sin^2 21^\circ + \sin^2 69^\circ) \text{ का मान कितना होगा?}$$

$$\sin 39 \sec 51 + 2 \times 1 \times 1 \times 1 - 3 \times 1$$

$$1 + 2 - 3$$

$$3 - 3 = 0$$

Q) Find the value of $\sin^2 15^\circ + \sin^2 25^\circ + \sin^2 35^\circ + \sin^2 45^\circ + \sin^2 55^\circ + \sin^2 65^\circ + \sin^2 75^\circ$?

$$\sin^2 15^\circ + \sin^2 25^\circ + \sin^2 35^\circ + \sin^2 45^\circ + \sin^2 55^\circ + \sin^2 65^\circ + \sin^2 75^\circ \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

$$1 + 1 + 1 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

Q) $\tan 7^\circ \tan 23^\circ \tan 60^\circ \tan 67^\circ \tan 83^\circ$ is equal to $\tan 7^\circ \tan 23^\circ \tan 60^\circ \tan 67^\circ \tan 83^\circ$ बराबर है -

$$1 \times 1 \times \sqrt{3}$$

$$= \sqrt{3}$$

- Q) If $\tan 2\theta \cdot \tan 4\theta = 1$, then what will be the value of $\tan 3\theta$?
 यदि $\tan 2\theta \cdot \tan 4\theta = 1$, तो $\tan 3\theta$ का मान क्या होगा ?

$$2\theta + 4\theta = 90^\circ$$

$$6\theta = 90^\circ$$

$$\boxed{\theta = 15^\circ}$$

$$\tan 3\theta = \tan (15 \times 3)$$

$$\tan 45^\circ = 1$$

- Q) The value of $\cot 10^\circ \cdot \cot 20^\circ \cdot \cot 60^\circ \cot 70^\circ \cot 80^\circ$ is -
 $\cot 10^\circ \cdot \cot 20^\circ \cdot \cot 60^\circ \cdot \cot 70^\circ \cdot \cot 80^\circ$ का मान है -

$$1 \times 1 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\textcircled{Q} \left[\frac{\operatorname{cosec} 31^\circ - \sec 59^\circ}{(\sin 18^\circ \div \cos 72^\circ)} \times \frac{\tan 26^\circ}{\cot 64^\circ} \right] + \left[\frac{\tan 30^\circ + \tan 15^\circ}{(1 - \tan 30^\circ \tan 15^\circ)} \right] = \text{---}$$

$\downarrow$
 $\tan 26^\circ \tan 64^\circ$
 $\downarrow$
 $\textcircled{1}$

$\downarrow$
 $\tan (30^\circ + 15^\circ)$
 $\tan 45^\circ$
 $= 1$

$$\frac{\operatorname{cosec} (90 - 59) - \sec 59}{\sin 18 \div \cos 72^\circ}$$

$$\frac{\sec 59 - \sec 59}{\sin 18 \div \cos 72^\circ} = 0$$

$$0 \times 1 + 1 = 1$$

- Q) If $\sin \alpha \sec (30^\circ + \alpha) = 1$ ($0 < \alpha < 60^\circ$), then the value of $\sin \alpha + \cos 2\alpha$ is -

यदि $\sin \alpha \sec (30^\circ + \alpha) = 1$ ($0 < \alpha < 60^\circ$), तो $\sin \alpha + \cos 2\alpha$ का मान है -

$$\alpha + 30 + \alpha = 90^\circ$$

$$2\alpha = 60$$

$$\boxed{\alpha = 30^\circ}$$

$$\sin \alpha + \cos 2\alpha$$

$$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Q) $\sin^2 5^\circ + \sin^2 6^\circ + \dots + \sin^2 84^\circ + \sin^2 85^\circ = ?$

No. of terms = $\frac{\text{last term} - \text{first term}}{\text{common diff.}} + 1$

$$\frac{85-5}{1} + 1$$

$$80 + 1 = 81$$

$$\frac{\text{No. of terms}}{2} = \frac{81}{2} = 40.5$$

IInd method

$$1 + 1 + \dots + 40 \text{ बार} + \sin^2 45^\circ$$

$$40 + \frac{1}{2}$$

$$40\frac{1}{2}$$

Q) What will be the value of $(\sin^2 1^\circ + \sin^2 3^\circ + \sin^2 5^\circ + \dots + \sin^2 85^\circ + \sin^2 87^\circ + \sin^2 89^\circ)$

$(\sin^2 1^\circ + \sin^2 3^\circ + \sin^2 5^\circ + \dots + \sin^2 85^\circ + \sin^2 87^\circ + \sin^2 89^\circ)$ का मान कितना होगा ?

$$\text{No. of terms} = \frac{89-1}{2} + 1$$

$$\frac{44 \times 88}{2} + 1 = 44 + 1 = 45$$

$$= \frac{45}{2} = 22\frac{1}{2}$$

Q) If $\sec(7\theta + 28^\circ) = \text{cosec}(30^\circ - 3\theta)$, then what will be the value of θ ?

यदि $\sec(7\theta + 28^\circ) = \text{cosec}(30^\circ - 3\theta)$ हो, तो θ का मान कितना होगा ?

if $A + B = 90^\circ$

$\sec A = \text{cosec } B$

$$7\theta + 28 + 30 - 3\theta = 90^\circ$$

$$4\theta = 90 - 58$$

$$4\theta = 32$$

$$\theta = 8^\circ$$

- Q) If $0 < x < \frac{\pi}{2}$ and $\sec x = \operatorname{cosec} y$ then what will be $\sin(x+y)$?
 यदि $0 < x < \frac{\pi}{2}$ तथा $\sec x = \operatorname{cosec} y$ हो तो $\sin(x+y)$ कितना होगा?

$$x+y=90^\circ$$

$$\frac{\sin(x+y)}{\sin 90^\circ}$$

- Q) The value of $\cot \frac{\pi}{20} \cot \frac{3\pi}{20} \cot \frac{5\pi}{20} \cot \frac{7\pi}{20} \cot \frac{9\pi}{20}$ is

$\cot \frac{\pi}{20} \cot \frac{3\pi}{20} \cot \frac{5\pi}{20} \cot \frac{7\pi}{20} \cot \frac{9\pi}{20}$ का मान है -

$$A+B=90^\circ=\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{20} + \frac{9\pi}{20} = \frac{10\pi}{20} = \frac{\pi}{2} \quad \frac{3\pi}{20} + \frac{7\pi}{20} = \frac{10\pi}{20} = \frac{\pi}{2} \quad \cot \frac{5\pi}{20} = \cot \frac{\pi}{4}$$

$$1 \times 1 \times \cot \frac{\pi}{4}$$

$$1 \times 1 \times 1 = 1$$

- Q) Consider the following : निम्न पर विचार करें:

1. $\frac{\cos 75^\circ}{\sin 15^\circ} + \frac{\sin 12^\circ}{\cos 78^\circ} - \frac{\cos 18^\circ}{\sin 72^\circ} = 1$ $1+1-1=1$

2. $\frac{\cos 35^\circ}{\sin 55^\circ} - \frac{\sin 11^\circ}{\cos 79^\circ} + \frac{\cos 28^\circ \operatorname{cosec} 62^\circ}{1} = 1$ $1-1+1=1$

3. $\frac{\sin 80^\circ}{\cos 10^\circ} - \sin 59^\circ \sec 31^\circ = 0$ $1-1=0$

$$\begin{cases} A+B=90^\circ \\ \frac{\sin A}{\cos B}=1 \end{cases}$$

Which of the above are correct?

उपरोक्त में से कौन सा सही है?

- a) 1 and 2 only
- b) 2 and 3 only
- c) 1 and 3 only
- d) 1, 2 and 3

Q) What is the value of $\sin 24^\circ \sin 66^\circ - \cos 24^\circ \cos 66^\circ + \tan 24^\circ \tan 66^\circ - \cot 24^\circ \cot 66^\circ$?

$$\sin 24^\circ \sin 66^\circ - \cos 24^\circ \cos 66^\circ + \tan \underbrace{24^\circ \tan 66^\circ}_{(1)} - \cot \underbrace{24^\circ \cot 66^\circ}_{(1)}$$

का मान क्या है?

$$24 + 66 = 90^\circ$$

$$- [\cos 24^\circ \cos 66^\circ - \sin 24^\circ \sin 66^\circ] + 1 - 1$$

$$- [\cos (24 + 66)] + 0$$

$$- \cos 90^\circ = 0$$

Q) What is the value of $\frac{\cos^2 32^\circ + \cos^2 58^\circ}{\sec^2 50^\circ - \cot^2 40^\circ} + 4 \tan 13^\circ \tan 37^\circ \tan 53^\circ \tan 77^\circ$?

$$\frac{\cos^2 32^\circ + \cos^2 58^\circ}{\sec^2 50^\circ - \cot^2 40^\circ} + 4 \tan 13^\circ \tan 37^\circ \tan 53^\circ \tan 77^\circ \text{ का मान क्या है?}$$

$4 \times 1 \times 1 = 4$

$$\frac{1}{\sec^2 50^\circ - \tan^2 50^\circ} + 4$$

$$\frac{1}{1} + 4$$

$$1 + 4 = 5$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cot 40^\circ = \tan 50^\circ \\ \cot (90 - 50^\circ) = \tan 50^\circ \end{array} \right\}$$

Q) If $\tan \theta \cdot \tan 2\theta = 1$, then the value of $\sin^2 2\theta + \tan^2 2\theta$ is:

यदि $\tan \theta \cdot \tan 2\theta = 1$, तो $\sin^2 2\theta + \tan^2 2\theta$ का मान है।

$$\begin{aligned} 3\theta &= 90^\circ \\ \theta &= 30^\circ \end{aligned}$$

$$\sin^2 60^\circ + \tan^2 60^\circ$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (\sqrt{3})^2$$

$$\frac{3}{4} + 3$$

$$\frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$$

Q) If θ is a positive acute angle, and $\tan 2\theta \tan 3\theta = 1$, then what is the value of $\left(2\cos^2 \frac{5\theta}{2} - 1\right)$?

यदि θ एक धनात्मक न्यूनकोण है, और $\tan 2\theta \tan 3\theta = 1$ हो, तो $\left(2\cos^2 \frac{5\theta}{2} - 1\right)$ का मान कितना होगा?

$$5\theta = 90^\circ$$

$$\theta = 18^\circ$$

$$2 \cos^2 \left(\frac{90}{2} \right) - 1$$

$$2 \cos^2 45^\circ - 1$$

$$2 \times \frac{1}{2} - 1 = 0$$

Q) If $\sin(3x - 20^\circ) = \cos(3y + 20^\circ)$, then what will be the value of $(x + y)$?

यदि $\sin(3x - 20^\circ) = \cos(3y + 20^\circ)$ हो, तो $(x + y)$ का मान कितना होगा?

$$3x - 20 + 3y + 20 = 90$$

$$3(x + y) = 90$$

$$x + y = 30$$

Q) What is the value of $(\sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ)$?

$(\sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ)$ का मान कितना होगा?

$$= 1$$

Q) What is the numerical value of $\cot 18^\circ \left(\cot 72^\circ \cos^2 22^\circ + \frac{1}{\tan 72^\circ \sec^2 68^\circ} \right)$

$\cot 18^\circ \left(\cot 72^\circ \cos^2 22^\circ + \frac{1}{\tan 72^\circ \sec^2 68^\circ} \right)$ का संख्यात्मक मान कितना है?

$$\cot 18^\circ [\cot 72^\circ \cos^2 22^\circ + \cot 72^\circ \cdot \cos^2 68^\circ]$$

$$\cot 18^\circ \cdot \cot 72^\circ [\cos^2 22^\circ + \cos^2 68^\circ]$$

$$1 \times 1$$

$$1$$

Q) The value of $(\sin^2 7\frac{1}{2}^\circ + \sin^2 82\frac{1}{2}^\circ + \tan^2 2^\circ \cdot \tan^2 88^\circ)$ is:

$(\sin^2 7\frac{1}{2}^\circ + \sin^2 82\frac{1}{2}^\circ + \tan^2 2^\circ \cdot \tan^2 88^\circ)$ का मान है;

$$1 + 1$$

$$1 + 1 = 2$$

Q) What is the value of $\frac{\sin 43^\circ}{\cos 47^\circ} + \frac{\cos 19^\circ}{\sin 71^\circ} - 8 \cos^2 60^\circ$

$\frac{\sin 43^\circ}{\cos 47^\circ} + \frac{\cos 19^\circ}{\sin 71^\circ} - 8 \cos^2 60^\circ$ का मान बताइए:

$$1+1-8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$2 - \cancel{8} \times \frac{1}{4}$$

$$2 - 2 = 0$$

Q) What is $2 \operatorname{cosec}^2 23^\circ \cot^2 67^\circ - \sin^2 23^\circ - \sin^2 67^\circ - \cot^2 67^\circ$ equal to?

$2 \operatorname{cosec}^2 23^\circ \cot^2 67^\circ - \sin^2 23^\circ - \sin^2 67^\circ - \cot^2 67^\circ$ किसके बराबर है?

$$2 \operatorname{cosec}^2 23^\circ \cot^2 67^\circ - \cot^2 67^\circ - (\sin^2 23^\circ + \sin^2 67^\circ)$$

$$2 \times \operatorname{cosec}^2 23^\circ \cdot \tan^2 23^\circ$$

$$2 \times \frac{1}{\sin^2 23^\circ} \times \frac{\sin^2 23^\circ}{\cos^2 23^\circ}$$

$$2 \sec^2 23^\circ$$

$$2 \sec^2 23^\circ - 1 - \frac{\cot^2 67^\circ}{\tan^2 23^\circ}$$

$$\sec^2 23^\circ + \sec^2 23^\circ - \tan^2 23^\circ - 1$$

$$\sec^2 23^\circ + 1 - 1$$

$$\sec^2 23^\circ$$

1. What is the value of $\sin^2 21 + \sin^2 69$?

$\sin^2 21 + \sin^2 69$ का मान क्या है?

- (a) 0
- (b) 2
- (c) 0.5
- (d) 1

2. What is the value of $\frac{\cos 37^\circ}{\sin 53^\circ}$?

$\frac{\cos 37^\circ}{\sin 53^\circ}$ का मान क्या होगा?

- (a) $1/2$
- (b) $1/\sqrt{2}$
- (c) 0
- (b) 1

3. What is the value of $\frac{4}{3}(\sin^2 35^\circ + \sin^2 55^\circ)$?

$\frac{4}{3}(\sin^2 35^\circ + \sin^2 55^\circ)$ का मान क्या है?

- (a) $8/9$
- (b) $4/3$
- (c) $3/4$
- (d) $2/3$

4. $\frac{(\cos 9^\circ + \sin 81^\circ)(\sec 9^\circ + \operatorname{cosec} 81^\circ)}{2\sin^2 63^\circ + 1 + 2\sin^2 27^\circ}$

- (a) $1/2$
- (b) $4/3$
- (c) 2
- (d) 1

5. $(\sin 37^\circ \cos 53^\circ + \cos 37^\circ \sin 53^\circ) \cdot \frac{4\cos^2 37^\circ - 7 + 4\cos^2 53^\circ}{\tan^2 47^\circ + 4 - \operatorname{cosec}^2 43^\circ} = ?$

- (a) 1
- (b) -2
- (c) 0
- (d) 2

6. $\frac{\tan 13^\circ \tan 36^\circ \tan 45^\circ \tan 54^\circ \tan 77^\circ}{2\sec^2 60^\circ (\sin^2 60^\circ - 3\cos 60^\circ + 2)} = ?$

- (a) $-\frac{1}{4}$
- (b) $-\frac{1}{10}$
- (c) $\frac{1}{10}$
- (d) $\frac{1}{4}$

7. The value of $\tan^2 48^\circ - \operatorname{cosec}^2 42^\circ + \operatorname{cosec}(67^\circ + \theta) - \sec(23^\circ - \theta)$ is

$\tan^2 48^\circ - \operatorname{cosec}^2 42^\circ + \operatorname{cosec}(67 + \theta) - \sec(23^\circ - \theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -1
(b) 0
(c) 1
(d) -2

8. If $4(\operatorname{cosec}^2 57^\circ - \tan^2 33^\circ) - \cos 90^\circ + y \tan^2 66^\circ \cdot \tan^2 24^\circ = \frac{y}{2}$ then the value of y is:

यदि $4(\operatorname{cosec}^2 57^\circ - \tan^2 33^\circ) - \cos 90^\circ + y \tan^2 66^\circ \cdot \tan^2 24^\circ = \frac{y}{2}$

है, तो y का मान ज्ञात करें।

- (a) 4
(b) -4
(c) 8
(d) -8

9. $\frac{1 - \tan A}{1 + \tan A} = \frac{\tan 3^\circ \tan 15^\circ \tan 30^\circ \tan 75^\circ \tan 87^\circ}{\tan 27^\circ \tan 39^\circ \tan 51^\circ \tan 60^\circ \tan 63^\circ}$, then the value of $\cot A$ is:

$\frac{1 - \tan A}{1 + \tan A} = \frac{\tan 3^\circ \tan 15^\circ \tan 30^\circ \tan 75^\circ \tan 87^\circ}{\tan 27^\circ \tan 39^\circ \tan 51^\circ \tan 60^\circ \tan 63^\circ}$ है, तो $\cot A$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 4

10. $\tan(63^\circ - \theta) - \cot(27^\circ + \theta) + \frac{\operatorname{cosec}^2 70 - \tan^2 20}{\sec^2 37 - \cot^2 53} = ?$

- (a) 2
(b) 3
(c) 0
(d) 1

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	B	B	D	C	A	D	B	D

Worksheet solution

sol 1

$$\sin^2 21 + \sin^2 69$$

$$\sin^2 21 + \sin^2 (90^\circ - 21^\circ)$$

$$\sin^2 21 + \cos^2 21 = 1$$

sol 2

$$\frac{\cos 37^\circ}{\sin 53^\circ} = \frac{\cos (90^\circ - 37^\circ)}{\sin 53^\circ} = \frac{\sin 53^\circ}{\sin 53^\circ} = 1$$

sol 3

$$= \frac{4}{3} (\sin^2 35 + \underbrace{\sin^2 55}_{\cos^2 (90 - 35)})$$

$$= \frac{4}{3} (\sin^2 35 + \cos^2 35) = \frac{4}{3}$$

sol 4

$$= \frac{(\cos 9^\circ + \sin 81^\circ) (\sec 9^\circ + \operatorname{cosec} 81^\circ)}{2 \sin^2 63^\circ + 1 + 2 \sin^2 27^\circ}$$

$$= \frac{[\cos 9^\circ + \sin (90^\circ - 9^\circ)] [\sec 9^\circ + \operatorname{cosec} (90^\circ - 9^\circ)]}{2 \sin^2 63^\circ + 1 + 2 \sin^2 (90^\circ - 27^\circ)}$$

$$= \frac{(\cos 9^\circ + \cos 9^\circ) (\sec 9^\circ + \sec 9^\circ)}{1 + 2 \sin^2 63^\circ + 2 \cos^2 63^\circ}$$

$$= \frac{(2 \cos 9^\circ) \cdot (2 \sec 9^\circ)}{1 + 2 (\sin^2 63^\circ + \cos^2 63^\circ)}$$

$$= \frac{2 \cos 9^\circ \times \frac{2}{\cos 9^\circ}}{1 + 2} = \frac{4}{3}$$

Sol 5

$$(\sin 37^\circ \cos 53^\circ + \cos 37^\circ \sin 53^\circ)$$

$$= \frac{4 \cos^2 37^\circ - 7 + 4 \cos^2 53^\circ}{\tan^2 47^\circ + 4 - \operatorname{cosec}^2 43^\circ}$$

$$A + B = 90^\circ$$

$$\text{Hence } \sin A = \cos B, \sec B = \operatorname{cosec} A$$

$$= \sin^2 37 + \cos^2 37 - \frac{4(\sin^2 37 + \cos^2 37) - 7}{-(\sec^2 47^\circ - \tan^2 47^\circ) + 4}$$

$$= 1 - \frac{4 - 7}{(-) + 4} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

Sol 6

$$\frac{\tan 13^\circ \cdot \tan 36^\circ \tan 45^\circ \tan 54^\circ \tan 77^\circ}{2 \sec^2 60^\circ (\sin^2 60^\circ - 3 \cos 60^\circ + 2)}$$

$$A + B = 90^\circ$$

Hence

$$\tan A \cdot \tan B = 1$$

$$= \frac{\tan 13^\circ \cdot \tan 77^\circ \tan 36^\circ \tan 54^\circ \tan 45^\circ}{2 \sec^2 60^\circ (\sin^2 60^\circ - 3 \cos 60^\circ + 2)}$$

$$= \frac{1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1}{2 \cdot \left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - 3 \times \frac{1}{2} + 2 \right)}$$

$$= \frac{1}{2 \times 4 \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{2} + 2 \right)} = \frac{1}{10}$$

Sol 7

$$\begin{aligned}
& \tan^2 48^\circ - \operatorname{cosec}^2 42^\circ + \operatorname{cosec} (17^\circ + \theta) - \sec (23^\circ - \theta) \\
&= \tan^2 48^\circ - \operatorname{cosec}^2 (90^\circ - 48^\circ) + \operatorname{cosec} (90^\circ - (23^\circ - \theta)) - \sec (23^\circ - \theta) \\
&= \tan^2 48^\circ - \sec^2 48^\circ + \sec (23^\circ - \theta) - \sec (23^\circ - \theta) \\
&= -(\sec^2 48^\circ - \tan^2 48^\circ) + 0 \\
&= -1
\end{aligned}$$

Sol 8

$$\begin{aligned}
& 4(\operatorname{cosec}^2 57^\circ - \tan^2 33^\circ) - \cos 90^\circ + y \tan^2 66^\circ \cdot \tan^2 24^\circ \\
&= \frac{y}{2}
\end{aligned}$$

$$\operatorname{cosec} (90^\circ - \theta) = \sec \theta$$

$$\operatorname{cosec} (90^\circ - 33^\circ) = \sec 33^\circ$$

$$4(\sec^2 33^\circ - \tan^2 33^\circ) - \cos 90^\circ + y \tan^2 66^\circ \cdot \tan^2 24^\circ = \frac{y}{2}$$

$$(\because \tan^2 A \cdot \tan^2 (90^\circ - A) = 1)$$

$$4 - 0 + y = \frac{y}{2}$$

$$y = -8$$

Sol 9

$$\frac{1 - \tan A}{1 + \tan A} = \frac{\tan 3^\circ \cdot \tan 15^\circ \cdot \tan 30^\circ \cdot \tan 75^\circ \cdot \tan 87^\circ}{\tan 27^\circ \cdot \tan 39^\circ \cdot \tan 51^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 63^\circ}$$

माना $\tan A \cdot \tan B = 1$

$$A + B = 90^\circ$$

$$\frac{1 - \tan A}{1 + \tan A} = \frac{\tan 30^\circ}{\tan 60^\circ}$$

$$\frac{1 - \tan A}{1 + \tan A} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{3}$$

Apply Componendo and dividendo:

$$\tan A = \frac{1}{2} \Rightarrow \cot A = 2$$

Sol 10

$$\tan(63^\circ - \theta) - \cot(27^\circ + \theta) + \frac{\operatorname{cosec}^2 70^\circ - \tan^2 20^\circ}{\sec^2 37^\circ - \cot^2 53^\circ}$$

$$(\tan(90^\circ - \theta) = \cot \theta)$$

$$\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta) = \sec \theta$$

$$\sec(90^\circ - \theta) = \operatorname{cosec} \theta$$

$$= \tan[90^\circ - (27^\circ + \theta)] - \cot(27^\circ + \theta) +$$

$$\frac{\operatorname{cosec}^2(90^\circ - 20^\circ) - \tan^2 20^\circ}{\sec^2(90^\circ - 53^\circ) - \cot^2 53^\circ}$$

$$= \cot(27^\circ + \theta) - \cot(27^\circ + \theta) + \frac{\sec^2 20^\circ - \tan^2 20^\circ}{\operatorname{cosec}^2 53^\circ + \cot^2 53^\circ}$$

$$= 0 + 1 = 1$$

TRIGONOMETRY

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

$$* \oplus \quad \sin(A+B) + \sin(A-B) = 2 \sin A \cos B$$

$$* \ominus \quad \sin(A+B) - \sin(A-B) = 2 \cos A \sin B$$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

$$* \oplus \quad \cos(A+B) + \cos(A-B) = 2 \cos A \cos B$$

$$* \ominus \quad \cos(A+B) - \cos(A-B) = -2 \sin A \sin B$$

$$* \quad + \cos(A-B) - \cos(A+B) = +2 \sin A \sin B$$

$$* \quad \sin C + \sin D = 2 \sin\left(\frac{C+D}{2}\right) \cos\left(\frac{C-D}{2}\right)$$

$$* \quad \sin C - \sin D = 2 \cos\left(\frac{C+D}{2}\right) \sin\left(\frac{C-D}{2}\right)$$

$$* \quad \cos C + \cos D = 2 \cos\left(\frac{C+D}{2}\right) \cos\left(\frac{C-D}{2}\right)$$

$$* \quad \cos C - \cos D = 2 \sin\left(\frac{C+D}{2}\right) \sin\left(\frac{D-C}{2}\right)$$

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$* \quad \boxed{\sin 2A} = \sin A \cdot \cos A + \cos A \cdot \sin A$$

$$\hookrightarrow 2 \sin A \cdot \cos A$$

$$\hookrightarrow = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$$

$$* \quad \boxed{\cos 2A} = 1 - 2 \sin^2 A$$

$$\hookrightarrow = 2 \cos^2 A - 1$$

$$\hookrightarrow \cos^2 A - \sin^2 A$$

$$\hookrightarrow = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$$

$$* \tan 2A = \left(\frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} \right)$$

$$* \cot 2A = \left(\frac{\cot^2 A - 1}{2 \cot A} \right)$$

Q) Find $(\alpha + \beta)$, if $\tan \alpha = \frac{m}{m+1}$ and $\tan \beta = \frac{1}{2m+1}$?

यदि $\tan \alpha = \frac{m}{m+1}$ और $\tan \beta = \frac{1}{2m+1}$ है, तो $(\alpha + \beta)$ ज्ञात कीजिये।

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

$$\frac{\frac{m}{m+1} + \frac{1}{2m+1}}{1 - \frac{m}{m+1} \times \frac{1}{2m+1}} = \frac{\frac{2m^2 + m + m + 1}{(m+1)(2m+1)}}{\frac{(m+1)(2m+1) - m}{(m+1)(2m+1)}}$$

$$\frac{2m^2 + 2m + 1}{2m^2 + m + 2m + 1 - m} = \frac{2m^2 + 2m + 1}{2m^2 + 2m + 1} = 1$$

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= 1 \\ \alpha + \beta &= 45^\circ \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

IInd Method

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

$$\begin{aligned} \text{Put } &= 1 \\ \tan \alpha &= \frac{1}{2} \\ \tan \beta &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = 1$$

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= 1 \\ \alpha + \beta &= 45^\circ \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Q) $\cos 18^\circ - \sin 18^\circ$

$$\cos 18^\circ - \sin (90 - 72)$$

$$\cos 18^\circ - \cos 72^\circ$$

$$2 \sin \frac{90^\circ}{2} \sin \frac{54^\circ}{2}$$

$$2 \sin 45^\circ \sin 27^\circ$$

$$2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \sin 27^\circ$$

$$= \sqrt{2} \sin 27^\circ$$

$$\left\{ \cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cdot \sin \frac{D-C}{2} \right\}$$

Q) $\sin 15^\circ + \sin 75^\circ = ?$

$$\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$$

$$= 2 \sin 45^\circ \times \cos 30^\circ$$

$$2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

Q) $\sin 15^\circ + \sin 165^\circ = ?$

$$\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$$

$$2 \times \sin 90^\circ \cdot \cos 75^\circ$$


$$2 \cos 75^\circ$$

$$\frac{2 \times (\sqrt{3}-1)}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1}$$

$$= \frac{3-1}{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}$$

$$\frac{2}{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}+1}$$



Q) $\cot x (\sin 5x - \sin 3x) = ?$

$$\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$$

$$\cot x (2 \cos 4x \cdot \sin x)$$

$$\frac{\cos x}{\sin x} \times 2 \cos 4x \cdot \sin x$$

$$= 2 \cos x \cdot \cos 4x$$

Q) $\frac{\sin 4\theta + \sin 2\theta}{\cos 4\theta + \cos 2\theta} = ?$

$$\frac{\cancel{2} \sin 3\theta \cos \theta}{\cancel{2} \cos 3\theta \cos \theta}$$

$$= \tan 3\theta$$

Q) $\sin 10^\circ + \sin 20^\circ + \sin 40^\circ + \sin 50^\circ = ?$

$$\frac{\sin 10^\circ + \sin 50^\circ}{2 \sin 30^\circ \times \cos 20^\circ} + \frac{\sin 20^\circ + \sin 40^\circ}{2 \sin 30^\circ \cos 10^\circ}$$

$$2 \sin 30^\circ [\cos 20^\circ + \cos 10^\circ]$$

$$2 \times \frac{1}{2}$$

$$= 2 \cos 15^\circ \cdot \cos 5^\circ$$

Q) $\frac{\cos 7A + \cos 11A}{\cos 7A - \cos 11A} = ?$

$$\frac{\cancel{2} \cos 9A \cos 2A}{\cancel{2} \sin 9A \times \sin 2A}$$

$$\frac{\cot 9A}{\left(\frac{\sin 2A}{\cos 2A}\right)} = \frac{\cot 9A}{\tan 2A}$$

Q) What is the value of $[(\sin 7x - \sin 5x) \div (\cos 7x + \cos 5x)] - [(\cos 6x - \cos 4x) \div (\sin 6x + \sin 4x)] = ?$

$[(\sin 7x - \sin 5x) \div (\cos 7x + \cos 5x)] - [(\cos 6x - \cos 4x) \div (\sin 6x + \sin 4x)]$ का मान क्या है?

$$\left[\frac{(2 \cos 6x \cdot \sin x) \div (2 \cos 6x \cos x)}{(2 \sin 5x \cdot \sin(-x)) \div (2 \sin 5x \cdot \cos x)} \right]$$

$$\left[\frac{\cancel{2 \cos 6x} \cdot \sin x}{\cancel{2 \cos 6x} \cos x} \right] - \left[\frac{\cancel{2 \sin 5x}(-\sin x)}{\cancel{2 \sin 5x} \cos x} \right]$$

$$\tan - (-\tan x)$$

$$\tan x + \tan x$$


$$2 \tan x$$

Q) $\tan 15^\circ - \cot 165^\circ = ?$

$$\tan 15^\circ - \cot (180 - 15)$$

$$\tan 15^\circ - (-\cot 15^\circ)$$

$$\boxed{\tan 15^\circ + \cot 15^\circ}$$



$$\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} + \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$$

$$\frac{(\sqrt{3}-1)^2 + (\sqrt{3}+1)^2}{3-1}$$

$$\frac{4 - 2\sqrt{3} + 4 + 2\sqrt{3}}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

1. $\sin 0^\circ \sin 30^\circ \cdot \sin 45^\circ \sin 60^\circ \sin 90^\circ = ?$

- (a) 1
- (b) 0
- (c) $\frac{\sqrt{6}}{8}$
- (d) 4

2. If $\cos 2A = \sin 75^\circ$, then the smallest positive value of A is :

यदि $\cos 2A = \sin 75^\circ$ है, तो A का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा?

- (a) 15°
- (b) 7.5°
- (c) 30°
- (d) 37.5°

3. If θ lies in the first quadrant and $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{1}{2}$, then find the value of $\tan^2 2\theta + \sin^2 3\theta$

यदि θ पहले चतुर्थांश में स्थित है और $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{1}{2}$ है, तो $\tan^2 2\theta + \sin^2 3\theta$ का मान ज्ञात करें।

- (a) $\frac{7}{2}$
- (b) 3
- (c) 4
- (d) $\frac{4}{3}$

4. The value of $\sin 2\theta(\tan \theta + \cot \theta)$ is :

$\sin 2\theta(\tan \theta + \cot \theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 2

5. What is the value of $\operatorname{cosec} 15^\circ \sec 15^\circ$?

$\operatorname{cosec} 15^\circ \sec 15^\circ$ का मान क्या है?

- (a) 0.5
- (b) 4
- (c) 2
- (d) 1

6. The value of $\frac{\sin 4\theta}{(1 - \cos 4\theta)}$ is :

$\frac{\sin 4\theta}{(1 - \cos 4\theta)}$ का मान क्या होगा?

- (a) $\cot \theta$
- (b) $\cot 2\theta$

(c) $\tan \theta$ (d) $\tan 2\theta$

7. $\frac{\sin 4\theta + \sin 2\theta}{\cos 4\theta + \cos 2\theta} = ?$

(a) $\tan 3\theta$ (b) $\cot 3\theta$ (c) $\tan \theta$ (d) $\cot \theta$ 8. What is the value of $(2\cos^2 \theta - 1) \left[\frac{1+\tan \theta}{1-\tan \theta} + \frac{1-\tan \theta}{1+\tan \theta} \right] ?$ $(2\cos^2 \theta - 1) \left[\frac{1+\tan \theta}{1-\tan \theta} + \frac{1-\tan \theta}{1+\tan \theta} \right]$ का मान क्या है?

(a) 2

(b) 0

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(d) 1

9. What is the value of $\sin 73^\circ + \cos 137^\circ$? $\sin 73^\circ + \cos 137^\circ$ का मान क्या होगा?(a) $\sin 13^\circ$ (b) $\cos 13^\circ$ (c) $\cos 18^\circ$ (d) $\sin 18^\circ$

10. Find the value of the following.

निम्न का मान ज्ञात कीजिए।

$$\frac{\sin 8\theta \cos \theta - \sin 6\theta \cos 3\theta}{\cos 2\theta \cos \theta - \sin 3\theta \sin 4\theta}$$

(a) $\cot \theta$ (b) $\cot 2\theta$ (c) $\tan \theta$ (d) $\tan 2\theta$ **ANSWER SHEET**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	C	D	B	B	A	A	A	D

Worksheet solution

Sol 1

$$\sin 0^\circ \cdot \sin 30^\circ \sin 45^\circ \sin 60^\circ \cdot \sin 90^\circ$$

$$\sin 0^\circ = 0$$

$\therefore$ All expression will become zero.

Sol 2

$$\cos 2A = \sin 75^\circ$$

$$\cos 2A = \cos 15^\circ$$

$$2A = 15^\circ$$

$$A = 7.5^\circ$$

Sol 3

$$\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{1}{2}$$

$$\cos 2\theta = \cos 60^\circ$$

$$2\theta = 60^\circ$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$\therefore \tan^2 2\theta + \sin^2 3\theta$$

$$\tan^2 60^\circ + \sin^2 90^\circ$$

$$(\sqrt{3})^2 + 1 = 4$$

Sol 4

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$$

$$\tan \theta + \cot \theta = \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$$

$$\therefore \sin 2\theta (\tan \theta + \cot \theta)$$

$$= 2 \sin \theta \cos \theta (\sec \theta \operatorname{cosec} \theta)$$

$$= 2$$

Sol 5

$$= \operatorname{Cosec} 15^\circ \cdot \sec 15^\circ$$

$$= \frac{1}{\sin 15^\circ} \cdot \frac{1}{\cos 15^\circ}$$

२^{वाँ} अंश और ४^{वाँ} में गुणा करने पर,

$$= \frac{2}{2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ}$$

$$= \frac{2}{\sin 2 \times 15^\circ} = \frac{2}{\sin 30^\circ} = 4$$

Sol 6

$$= \frac{2 \sin 2\theta \cdot \cos 2\theta}{1 - (1 - 2 \sin^2 \theta)}$$

$$= \frac{2 \sin 2\theta \cdot \cos 2\theta}{1 - (1 + 2 \sin^2 2\theta)}$$

$$= \frac{2 \sin 2\theta \cdot \cos 2\theta}{2 \sin^2 2\theta} = \cot 2\theta$$

Sol 7

$$\frac{\sin 4\theta + \sin 2\theta}{\cos 4\theta + \cos 2\theta} = \frac{2 \sin \left(\frac{4\theta + 2\theta}{2} \right) \cdot \cos \frac{2\theta}{2}}{2 \cos 3\theta \cdot \cos \theta}$$

$$= \frac{2 \sin 3\theta \cdot \cos \theta}{2 \cos 3\theta \cdot \cos \theta}$$

$$= \tan 3\theta$$

Sol 8

$$= (2 \cos^2 \theta - 1) \left[\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} + \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} \right]$$

$$= (2 \cos^2 \theta - 1) \left[\frac{(1 + \tan \theta)^2 + (1 - \tan \theta)^2}{(1 - \tan \theta) \cdot (1 + \tan \theta)} \right]$$

$$= (2 \cos^2 \theta - 1) \left[\frac{1 + \tan^2 \theta + 2 + 2 \tan \theta + 1 + \tan^2 \theta - 2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} \right]$$

$$= (2\cos^2 \theta - 1) \vee \frac{2(1 + \tan^2 \theta)}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$= \cos 2\theta \vee \frac{2}{\cos 2\theta} = 2$$

sol 9

$$\sin 73^\circ + \cos 137^\circ$$

$$= \sin 73^\circ + \cos(90^\circ + 47^\circ)$$

$$= \frac{2 \cos 73^\circ + 47^\circ}{2} \cdot \frac{\sin 73^\circ - 47^\circ}{2}$$

$$= \frac{2 \cos 60^\circ \cdot \sin 26^\circ}{2}$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \cdot \sin 13^\circ = \sin 13^\circ$$

sol 10

$$\frac{\sin 8\theta \cos \theta - \sin 6\theta \cos 3\theta}{\cos 2\theta \cos \theta - \sin 3\theta \sin 4\theta}$$

$$= \frac{2 \sin 8\theta \cos \theta - 2 \sin 6\theta \cos 3\theta}{2 \cos 2\theta \cdot \cos \theta - 2 \sin 3\theta \cdot \sin 4\theta}$$

$$= \frac{\sin 9\theta + \sin 7\theta - \sin 9\theta - \sin 3\theta}{\cos 3\theta + \cos \theta - \cos \theta + \cos 7\theta}$$

$$= \frac{\sin 7\theta - \sin 3\theta}{\cos 3\theta + \cos 7\theta}$$

$$= \frac{2 \cos \frac{7\theta + 3\theta}{2} \sin \frac{7\theta - 3\theta}{2}}{2 \cos \frac{3\theta + 7\theta}{2} \cos \frac{3\theta - 7\theta}{2}} = \frac{\cos 5\theta \cdot \sin 2\theta}{\cos 5\theta \cdot \cos 2\theta}$$

$$= \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} = \tan 2\theta$$

TRIGONOMETRY

$$\begin{aligned} \bullet \cos 2\theta &= 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta \\ &= \frac{1 - \tan^2\theta}{1 + \tan^2\theta} \end{aligned}$$

∴ Halfangle ∴

$$\bullet 2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$$

$$\cos\theta = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}}$$

$$\bullet 2\sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta$$

$$\sin\theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}}$$

Ex:- $\cos 22\frac{1}{2}^\circ$ ↓ $\cos 22\frac{1}{2}^\circ = \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}}$

$$\sqrt{\frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}{2}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2} + 1}{2\sqrt{2}}}$$

$$\bullet \frac{\cos 2\theta}{1} = \frac{1 - \tan^2\theta}{1 + \tan^2\theta}$$

$$\frac{1}{\cos 2\theta} = \frac{1 + \tan^2\theta}{1 - \tan^2\theta}$$

apply C & D Rule

$$\frac{1 + \cos 2\theta}{1 - \cos 2\theta} = \frac{1}{\tan^2\theta}$$

$$\tan^2\theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

$$\tan\theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}}$$

• $(45^\circ + \theta)$

$$\tan(45^\circ + \theta) = \frac{\tan 45^\circ + \tan \theta}{1 - \tan 45^\circ \tan \theta} = \left\{ \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} \right\}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{1 + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{1 - \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}$$

$$\left\{ \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta - \sin \theta} \right\}$$

$$\frac{(\cos \theta + \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}$$

$$\frac{1 + 2 \sin \theta \cos \theta}{\cos 2\theta}$$

$$\frac{1 + \sin 2\theta}{\cos 2\theta}$$

$$\boxed{\sec 2\theta + \tan 2\theta}$$

$$\star \tan(45^\circ + \theta) = \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = \sec 2\theta + \tan 2\theta$$

$$\star \cot(45^\circ + \theta) = \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} = \sec 2\theta - \tan 2\theta$$

Q) $\tan 54^\circ = ?$

$$\tan(45^\circ + 9^\circ)$$

$$\frac{\cos 9^\circ + \sin 9^\circ}{\cos 9^\circ - \sin 9^\circ}$$

Q) Simplify the expression: व्यंजक को सरल करें:

$$\frac{1 - \tan^2(22.5^\circ)}{1 + \tan^2(22.5^\circ)}$$

$$\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}$$

$$\frac{1 - \tan^2(22.5^\circ)}{1 + \tan^2(22.5^\circ)} = \cos 45^\circ$$

$$\downarrow$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Q) Find the value of $\frac{[1 + \tan^2 \frac{2\pi - \theta}{2}]}{[2 \cot \frac{\pi - \theta}{2}]}$?

$\frac{[1 + \tan^2 \frac{2\pi - \theta}{2}]}{[2 \cot \frac{\pi - \theta}{2}]}$ का मान ज्ञात कीजिये।

$$\frac{1 + \tan^2 (\pi - \frac{\theta}{2})}{2 \cot (\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2})}$$

$$\frac{\sec^2 (\pi - \frac{\theta}{2})}{2 \tan \frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{\sec^2 \frac{\theta}{2}}{2 \tan \frac{\theta}{2}} = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} \times \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

$$\frac{1}{2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2}}$$

$$\frac{1}{\sin \theta} = \operatorname{cosec} \theta$$

Q) The value of $\frac{\sin 2^\circ}{\sqrt{(2 \cos^2 46^\circ - 1)^2}} + \frac{\sin 4^\circ}{\sqrt{(1 - 2 \sin^2 43^\circ)^2}}$ is

$\frac{\sin 2^\circ}{\sqrt{(2 \cos^2 46^\circ - 1)^2}} + \frac{\sin 4^\circ}{\sqrt{(1 - 2 \sin^2 43^\circ)^2}}$ का मान है।

$$\frac{\sin 2^\circ}{\cos 92^\circ} + \frac{\sin 4^\circ}{\cos 86^\circ}$$

$$\frac{\sin 2^\circ}{\cos (90 + 2)} + 1$$

$$\textcircled{1} \frac{\sin 2^\circ}{-\sin 2^\circ} + 1$$

$$-1 + 1 = 0$$

Q) Consider the following निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

$$(1) \cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)}{\cos 2\theta}$$

$$(2) \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$(3) \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

Which of the above equations are identities?

उपर्युक्त समीकरणों में से कौन - सी सर्वसमिकाएँ हैं ?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

$$Q) \frac{1}{2} [\sqrt{3} \cos 23^\circ - \sin 23^\circ] = ?$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 23^\circ - \frac{1}{2} \sin 23^\circ \right]$$

$$\frac{1}{2} [\cos 30^\circ \cos 23^\circ - \sin 30^\circ \sin 23^\circ]$$

$$\therefore \cos A \cos B - \sin A \sin B = \cos (A+B)$$

$$\frac{1}{2} \cos (30+23)$$

$$\frac{1}{2} \cos 53^\circ$$

Q) Find the value of A for the given equation.

दिए गए समीकरण के लिए A का मान ज्ञात कीजिए।

$$\tan A + \tan 2A + \tan 3A = \tan A \tan 2A \tan 3A$$

$$\tan A + \tan 2A = -\tan 3A + \tan A \tan 2A \tan 3A$$

$$\tan A + \tan 2A = -\tan 3A [1 - \tan A \tan 2A]$$

$$\frac{\tan A + \tan 2A}{1 - \tan A \tan 2A} = -\tan 3A$$

$$\tan(A+2A) = -\tan 3A$$

$$\tan 3A = -\tan 3A$$

$$2 \tan 3A = 0$$

$$\tan 3A = 0$$

By option

$$\boxed{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}}$$

$$\tan 2 \times \frac{\pi}{3}$$

$$\tan \pi = 0$$

$$\tan \left(2 \times \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\tan 2\pi = 0$$

Q) Find the value of $\tan \frac{2\pi}{5} - \tan \frac{\pi}{15} - \sqrt{3} \tan \frac{2\pi}{5} \tan \frac{\pi}{15}$?

$\tan \frac{2\pi}{5} - \tan \frac{\pi}{15} - \sqrt{3} \tan \frac{2\pi}{5} \tan \frac{\pi}{15}$ का मान ज्ञात कीजिये।

$$\tan \left(\frac{2\pi}{5} - \frac{\pi}{15} \right) = \frac{\tan \frac{2\pi}{5} - \tan \frac{\pi}{15}}{1 + \tan \frac{2\pi}{5} \tan \frac{\pi}{15}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{2\pi}{5} + \frac{\pi}{15} = \frac{6\pi + \pi}{15} = \frac{7\pi}{15} \\ \frac{2\pi}{5} + \frac{\pi}{15} = \frac{6\pi - \pi}{15} = \frac{5\pi}{15} = \frac{\pi}{3} \end{array} \right\}$$

$$\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \left(1 + \tan \frac{2\pi}{5} \tan \frac{\pi}{15} \right) = \tan \frac{2\pi}{5} - \tan \frac{\pi}{15}$$

$$\sqrt{3} + \sqrt{3} \tan \frac{2\pi}{5} \tan \frac{\pi}{15} = \tan \frac{2\pi}{5} - \tan \frac{\pi}{15}$$

$$\tan \frac{2\pi}{5} - \tan \frac{\pi}{15} - \sqrt{3} \tan \frac{2\pi}{5} \tan \frac{\pi}{15} = \sqrt{3}$$

Q) Find the value of $\tan 250^\circ$?

$\tan 250^\circ$ का मान ज्ञात कीजिये।

$$\tan (180 + 70)$$

$$= \tan 70^\circ$$

$$\tan (50 + 20) = \frac{\tan 50 + \tan 20}{1 - \tan 50 \tan 20}$$

$$\tan 70^\circ (1 - \tan 50^\circ \tan 20^\circ) = \tan 50^\circ + \tan 20^\circ$$

$$\tan 70^\circ - \tan 70^\circ \tan 50^\circ \tan 20^\circ = \tan 50^\circ + \tan 20^\circ$$

$$\tan 70^\circ - \tan 50^\circ = \tan 50^\circ + \tan 20^\circ$$

$$\tan 70^\circ = 2 \tan 50^\circ + \tan 20^\circ$$

TRIPLE ANGLE

- $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

$B=2A$

$$\sin 3A = \sin A \cos 2A + \cos A \sin 2A$$

$$\sin A (1 - 2\sin^2 A) + \cos A \cdot 2 \sin A \cos A$$

$$\sin A - 2\sin^3 A + (1 - \sin^2 A) \cdot 2 \sin A$$

$$\sin A - 2\sin^3 A + 2 \sin A - 2\sin^3 A$$

$\sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A$

- $\sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A$

$A=90+A$

$$\sin(270+3A)$$

$$-\cos 3A = 3 \sin(90+A) - 4 \sin^3(90+A)$$

$$3 \cos A - 4 \cos^3 A$$

$\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A$

- $\tan 3\theta$

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$$

$$\tan(\theta + 2\theta) = \frac{\tan \theta + \tan 2\theta}{1 - \tan \theta \cdot \tan 2\theta}$$

$$\tan(3\theta)$$

$$\frac{\tan \theta + \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}}{1 - \tan \theta \cdot \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}}$$

$$\frac{1 - \tan \theta \cdot \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\frac{\tan \theta - \tan^3 \theta + 2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta - 2 \tan^2 \theta}$$

$\frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}$

Q) $\frac{3 \sin \theta - \sin 3\theta}{3 \cos \theta + \cos 3\theta} = ?$

$$\frac{3 \sin \theta - (3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta)}{3 \cos \theta + 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta}$$

$$\frac{4 \sin^3 \theta}{4 \cos^3 \theta} = \tan^3 \theta$$

Ex:- $\sin 40^\circ \sin 20^\circ \sin 80^\circ = \frac{1}{4} \sin 60^\circ$

• $\sin (60^\circ - A) \sin A \sin (60^\circ + A) = \frac{1}{4} \sin 3A$

• $\cos (60^\circ - A) \cos A \cos (60^\circ + A) = \frac{1}{4} \cos 3A$

• $\tan (60^\circ - A) \tan A \tan (60^\circ + A) = \tan 3A$

Q) The value of $(\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ)$ is:

$(\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ)$ का मान है:

$\theta = 10^\circ$
 $\sin \theta \sin (60^\circ - \theta) \sin (60^\circ + \theta) = \frac{1}{4} \sin 3\theta$

$= \frac{1}{4} \sin 30^\circ$

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Q) The value of $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ is:

$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ का मान है:

$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$
 $\cos (60^\circ - 20^\circ) \cos 20^\circ \cos (60^\circ + 20^\circ)$

$= \frac{1}{4} \cos 3 \times 20^\circ$

$= \frac{1}{4} \cos 60^\circ$

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Q) The value of $(\tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 80^\circ)$ is:

$(\tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 80^\circ)$ का मान है:

$\tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 80^\circ$
 $\tan 20^\circ \tan (60^\circ - 20^\circ) \tan (60^\circ + 20^\circ)$

$\tan 3\theta$

$\tan 3 \times 20^\circ$

$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

Q) What is the value of $\cos 1^\circ \cdot \cos 2^\circ \cdot \cos 3^\circ \dots \cos 177^\circ \cdot \cos 178^\circ \cdot \cos 179^\circ$

$\cos 1^\circ \cdot \cos 2^\circ \cdot \cos 3^\circ \dots \cos 177^\circ \cdot \cos 178^\circ \cdot \cos 179^\circ$ का मान क्या है?

$\cos 90^\circ$



-----XO X-----

Ans=0

Q) $\sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdot \sin 3^\circ \dots \cdot \sin 180^\circ$ is equal to -
 $\sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdot \sin 3^\circ \dots \cdot \sin 180^\circ$ किसके बराबर है?

-----X0

Ans = 0

1. $\sin 10^\circ + \sin 20^\circ + \sin 40^\circ + \sin 50^\circ = ?$

- (a) $2\sin 15^\circ \cos 5^\circ$
- (b) $2\cos 15^\circ \sin 5^\circ$
- (c) $2\sin 15^\circ \sin 5^\circ$
- (d) $2\cos 15^\circ \cos 5^\circ$

2. The value of $\tan 5^\circ \tan 25^\circ \tan 45^\circ \tan 65^\circ \tan 85^\circ$ is:

$\tan 5^\circ \tan 25^\circ \tan 45^\circ \tan 65^\circ \tan 85^\circ$ का मान है:

- (a) 1
- (b) -1
- (c) 3
- (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. What is the average of the sixty terms given below?

$\cos^2 x, \cos^2 2x, \cos^2 3x, \dots, \cos^2 30x, \sin^2 x, \sin^2 2x, \sin^2 3x \dots \sin^2 30x$

नीचे दिए गए साठ पदों का औसत क्या होगा?

$\cos^2 x, \cos^2 2x, \cos^2 3x, \dots, \cos^2 30x, \sin^2 x, \sin^2 2x, \sin^2 3x \dots \sin^2 30x$

- (a) $\cos^2 x$
- (b) 0.5
- (c) 1
- (d) $\cos^2 x \sin^2 x$

4. $\operatorname{cosec}(67^\circ + \theta) - \sec(23^\circ - \theta) + \cos 15^\circ \cos 35^\circ \operatorname{cosec} 55^\circ \cos 60^\circ \operatorname{cosec} 75^\circ$

- (a) 2
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 0.5

5. If $\sin x = \frac{1}{3}$, the value of $\sin 3x$ is:

यदि $\sin x = \frac{1}{3}$, तो $\sin 3x$ का मान है:

- (a) $\frac{11}{23}$
- (b) $\frac{13}{27}$
- (c) $\frac{19}{27}$
- (d) $\frac{23}{27}$

6. If $\cos x = \frac{1}{2}$, the value of $\cos 3x$ is:

यदि $\cos x = \frac{1}{2}$, तो $\cos 3x$ का मान है:

- (a) $\frac{3}{2}$
- (b) $\frac{-1}{2}$
- (c) 1
- (d) -1

7. If the value of $\left(\frac{1}{\cot 20^\circ} \frac{1}{\cot 40^\circ} \frac{1}{\cot 80^\circ}\right)$ is:

$\left(\frac{1}{\cot 20^\circ} \frac{1}{\cot 40^\circ} \frac{1}{\cot 80^\circ}\right)$ का मान है:

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(b) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(c) $\sqrt{3}$

(d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

8. If the value of $\left(\frac{1}{\operatorname{cosec} 10^\circ} \frac{1}{\operatorname{cosec} 50^\circ} \frac{1}{\operatorname{cosec} 70^\circ}\right)$

$\left(\frac{1}{\operatorname{cosec} 10^\circ} \frac{1}{\operatorname{cosec} 50^\circ} \frac{1}{\operatorname{cosec} 70^\circ}\right)$ का मान है:

(a) $\frac{1}{4}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{8}$

(d) $\frac{3}{4}$

9. If the value of $\left(\frac{1}{\sec 20^\circ} \frac{1}{\sec 40^\circ} \frac{1}{\sec 80^\circ}\right)$

$\left(\frac{1}{\sec 20^\circ} \frac{1}{\sec 40^\circ} \frac{1}{\sec 80^\circ}\right)$ का मान है:

(a) 1

(b) $\frac{1}{4}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{1}{8}$

10. The value of $(\tan 10^\circ \tan 50^\circ \tan 70^\circ)$ is:

$(\tan 10^\circ \tan 50^\circ \tan 70^\circ)$ का मान है:

(a) $\frac{3}{4}$

(b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\frac{3}{8}$

(d) $\frac{\sqrt{3}}{8}$

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	B	D	D	D	C	C	D	B

Worksheet solution

sol 1

$$\begin{aligned} & \sin 10^\circ + \sin 20^\circ + \sin 40^\circ + \sin 50^\circ \\ &= (\sin 50^\circ + \sin 10^\circ) + (\sin 40^\circ + \sin 20^\circ) \\ &= 2 \sin \left(\frac{50^\circ + 10^\circ}{2} \right) \cos \left(\frac{50^\circ - 10^\circ}{2} \right) + 2 \sin \left(\frac{40^\circ + 20^\circ}{2} \right) \\ & \quad \cdot \cos \left(\frac{40^\circ - 20^\circ}{2} \right) \\ &= 2 \sin 30^\circ \cdot \cos 20^\circ + 2 \sin 30^\circ \cdot \cos 10^\circ \\ &= 2 \sin 30^\circ [\cos 20^\circ + \cos 10^\circ] \\ &= 2 \sin 30^\circ \left[2 \cos \left(\frac{20^\circ + 10^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{20^\circ - 10^\circ}{2} \right) \right] \\ &= 2 \times \frac{1}{2} [2 \cos 15^\circ \cdot \cos 5^\circ] = 2 \cos 15^\circ \cos 5^\circ \end{aligned}$$

sol 2

$$\begin{aligned} & \tan 5^\circ \tan 25^\circ \tan 45^\circ \tan 65^\circ \tan 85^\circ \\ &= (\tan 5^\circ \cdot \tan 85^\circ) (\tan 25^\circ \cdot \tan 65^\circ) \cdot \tan 45^\circ \\ &= (\tan 5^\circ \cdot \cot 5^\circ) (\tan 25^\circ \cdot \cot 25^\circ) \cdot \tan 45^\circ \\ &= 1 \end{aligned}$$

sol 3

$$\begin{aligned} & \cos^2 n, \cos^2 2n, \cos^2 3n, \dots, \cos^2 30n, \sin^2 n, \\ & \sin^2 2n, \sin^2 3n, \dots, \sin^2 30n \\ &= \frac{(\cos^2 n + \sin^2 n) + \dots + (\cos^2 30n + \sin^2 30n)}{60} \\ &= \frac{30}{60} = \frac{1}{2} = 0.5 \end{aligned}$$

sol 4

$$\operatorname{cosec}(67^\circ + \theta) - \sec(23^\circ - \theta) + \cos 15^\circ \cos 35^\circ$$
$$\operatorname{cosec} 55^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \operatorname{cosec} 75^\circ$$

$$\theta = 0^\circ \text{ रखने पर}$$

$$= \operatorname{cosec} 67^\circ - \sec(90^\circ - 67^\circ) + \cos 15^\circ \cos 35^\circ \cdot \frac{1}{\sin 55^\circ}$$

$$\times \cos 60^\circ + \frac{1}{\sin 75^\circ}$$
$$= \operatorname{cosec} 67^\circ - \operatorname{cosec} 67^\circ + \cos 15^\circ \cos 35^\circ \frac{1}{\cos 35^\circ}$$
$$\times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\cos 15^\circ}$$

$$= \frac{1}{2} = 0.5$$

sol 5

$$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$$

$$= 3 \times \frac{1}{3} - 4\left(\frac{1}{3}\right)^3$$

$$= 1 - \frac{4}{27} = \frac{23}{27}$$

sol 6

$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

$$= 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3 \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) = -1$$

sol 7

$$\frac{1}{\cot 20^\circ} \cdot \frac{1}{\cot 40^\circ} \cdot \frac{1}{\cot 60^\circ}$$

$$= \tan 20^\circ \cdot \tan 40^\circ \cdot \tan 60^\circ$$

$$= \tan 20^\circ \cdot \tan(60^\circ - 20^\circ) \cdot \tan(60^\circ + 20^\circ)$$

$$= \tan 3\theta = \tan 3 \times 20^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

Sol 8

$$\frac{1}{\operatorname{Cosec} 10^\circ} \cdot \frac{1}{\operatorname{Cosec} 50^\circ} \cdot \frac{1}{\operatorname{Cosec} 70^\circ}$$

$$= \sin 10^\circ \cdot \sin 50^\circ \cdot \sin 70^\circ$$

$$= \sin 10^\circ \cdot \sin(60^\circ - 10^\circ) \cdot \sin(60^\circ + 10^\circ)$$

$$= \frac{1}{4} \sin 3A$$

$$= \frac{1}{4} \times \sin 3 \times 10^\circ = \frac{1}{4} \sin 30^\circ = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Sol 9

$$\frac{1}{\sec 20^\circ} \cdot \frac{1}{\sec 40^\circ} \cdot \frac{1}{\sec 80^\circ}$$

$$= \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$$

$$= \cos 20^\circ \cdot \cos(60^\circ - 20^\circ) \cos(60^\circ + 20^\circ)$$

$$= \frac{1}{4} \cos 3A$$

$$= \frac{1}{4} \cos 3 \times 20^\circ = \frac{1}{4} \cos 60^\circ = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Sol 10

$$\tan 10^\circ \cdot \tan 50^\circ \cdot \tan 70^\circ$$

$$= \tan 10^\circ \tan(60^\circ - 10^\circ) \tan(60^\circ + 10^\circ)$$

$$= \tan 3A$$

$$= \tan 3 \times 10^\circ = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

TRIGONOMETRY

Q) Find: $\tan\left(\frac{5\pi}{4} + \theta\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$

जात कीजिये: $\tan\left(\frac{5\pi}{4} + \theta\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$

$$\tan\left(\pi + \left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$$

$$\sec 2\theta + \tan 2\theta - (\sec 2\theta - \tan 2\theta)$$

$$\cancel{\sec 2\theta} + \tan 2\theta - \cancel{\sec 2\theta} + \tan 2\theta$$

$$2 \tan 2\theta$$

Q) If $A+B+C = \pi$, then the value of $\tan(A+B) + \tan C$ is:

यदि $A+B+C = \pi$, तो $\tan(A+B) + \tan C$ का मान है:

$$C = \pi - (A+B)$$

$$\tan C = \tan(\pi - (A+B))$$

$$\tan C = -\tan(A+B)$$

$$\tan C + \tan(A+B) = 0$$

Q) If $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$, then $(A+B+C)$ will be equal to:

यदि $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$, तो $(A+B+C)$ बराबर होगा:

$$A+B+C = 180^\circ/\pi$$

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$$

#

$$\boxed{A+B+C = 180^\circ}$$

$$A+B = 180 - C$$

$$\tan(A+B) = \tan(180 - C)$$

$$\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\tan C$$

$$\tan A + \tan B = -\tan C + \tan A \tan B \tan C$$

$$\boxed{\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C}$$

#

$$A = B + C$$

$$\tan A = \tan(B + C)$$

↓

$$\tan A = \frac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B \tan C}$$

$$\tan A - \tan A \tan B \tan C = \tan B + \tan C$$

$$\tan A - \tan B - \tan C = \tan A \tan B \tan C$$

Ex:- $\tan 80^\circ - \tan 70^\circ - \tan 10^\circ = ?$
 $= \tan 80^\circ \tan 70^\circ \tan 10^\circ$

Q) If $\tan A - \tan B - \tan C = \tan A \tan B \tan C$, what is the value of A in terms of B and C ?

यदि $\tan A - \tan B - \tan C = \tan A \tan B \tan C$ है, तो B और C के संदर्भ में A का मान क्या है?

$$A = B + C$$

Q) $\tan 13x - \tan 9x - \tan 4x =$
 $\tan 13x \cdot \tan 9x \cdot \tan 4x$

#

$$a \sin x + b \cos x = m$$

$$a \cos x - b \sin x = n$$

$$(a^2 + b^2)(\underbrace{\sin^2 x + \cos^2 x}_1) = m^2 + n^2$$

$$a^2 + b^2 = m^2 + n^2$$

#

$$a \sec x - b \tan x = m$$

$$a \tan x - b \sec x = n$$

$$a^2 - b^2 = m^2 - n^2$$

#

$$a \operatorname{cosec} x - b \cot x = m$$

$$a \cot x - b \operatorname{cosec} x = n$$

$$a^2 - b^2 = m^2 - n^2$$

Q) If $x = a \cos \theta + b \sin \theta$ and $y = a \sin \theta - b \cos \theta$, then the value of $x^2 + y^2$ is:

यदि $x = a \cos \theta + b \sin \theta$ तथा $y = a \sin \theta - b \cos \theta$ है, तो $x^2 + y^2$ का मान ज्ञात करें।

$$a^2 + b^2 = x^2 + y^2$$

Q) यदि $x = m \sec A + n \tan A$ और $y = m \tan A + n \sec A$ है, तो $x^2 - y^2$ का मान क्या है?

If $x = m \sec A + n \tan A$ and $y = m \tan A + n \sec A$, then what is $x^2 - y^2$ equal to

$$m \sec A + n \tan A = x$$

$$m \tan A + n \sec A = y$$

$$m \sec A - (-n) \tan A = x$$

$$m \tan A - (-n) \sec A = y$$

$$m^2 - (-n)^2 = x^2 - y^2$$

$$m^2 - n^2 = x^2 - y^2$$

Q) If $a \cot \theta + b \operatorname{cosec} \theta = p$ and $b \cot \theta + a \operatorname{cosec} \theta = q$, then $p^2 - q^2$ is equal to:

यदि $a \cot \theta + b \operatorname{cosec} \theta = p$ और $b \cot \theta + a \operatorname{cosec} \theta = q$ है, तो $p^2 - q^2$ निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा?

$$b \operatorname{cosec} \theta + a \cot \theta = p$$

$$b \cot \theta + a \operatorname{cosec} \theta = q$$

$$b \operatorname{cosec} \theta - (-a) \cot \theta = p$$

$$b \cot \theta - (-a) \operatorname{cosec} \theta = q$$

$$b^2 - a^2 = p^2 - q^2$$

Q) If $3 \sin \theta + 5 \cos \theta = 5$, then what is the value of $5 \sin \theta - 3 \cos \theta$?

यदि $3 \sin \theta + 5 \cos \theta = 5$, तो $5 \sin \theta - 3 \cos \theta$ का मान क्या है?

$$3 \cos \theta - 5 \sin \theta = n$$

$$3^2 + 5^2 = n^2$$

$$\boxed{n = \pm 3}$$

$$5 \sin \theta - 3 \cos \theta$$

$$-(3 \cos \theta - 5 \sin \theta)$$

$$-3$$

Q) If $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin x$, then the value of $\sin x - \cos x$.

यदि $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin x$ है, तो $\sin x - \cos x$ का मान ज्ञात करें।

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin x$$

$$\cos x - \sin x = n$$

$$1^2 + 1^2 = (\sqrt{2} \sin x)^2 + n^2$$

$$2 - 2 \sin^2 x = n^2$$

$$2(1 - \sin^2 x) = n^2$$

$$2 \cos^2 x = n^2$$

$$\boxed{n = \sqrt{2} \cos x}$$

$$\sin x - \cos x$$

$$-(\cos x - \sin x)$$

$$-(\sqrt{2} \cos x)$$

$$-\sqrt{2} \cos x$$

Q) If $\cos x + \sin x = \sqrt{2} \cos x$, what will be the value of $(\cos x - \sin x)^2 + (\cos x + \sin x)^2$?

यदि $\cos x + \sin x = \sqrt{2} \cos x$ है, तो $(\cos x - \sin x)^2 + (\cos x + \sin x)^2$ का मान क्या होगा?

$$\sin x - \cos x = n$$

$$1^2 + 1^2 = (\sqrt{2} \cos x)^2 + n^2$$

$$2 - 2 \cos^2 x = n^2$$

$$2(1 - \cos^2 x)$$

$$2 \sin^2 x = n^2$$

$$\boxed{n = \sqrt{2} \sin x}$$

$$(\cos x - \sin x)^2 + (\cos x + \sin x)^2$$

$$(\sqrt{2} \sin x)^2 + (\sqrt{2} \cos x)^2$$

$$2 \sin^2 x + 2 \cos^2 x$$

$$2(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$\textcircled{1}$$

$$2 \times 1 = 2$$

Q) If $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{11}}{3}$, Find the value of $(\cos \theta - \sin \theta)$.

यदि $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{11}}{3}$ है, तो $(\cos \theta - \sin \theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$\cos \theta - \sin \theta = n$$

$$1^2 + 1^2 = \left(\frac{\sqrt{11}}{3}\right)^2 + n^2$$

$$2 = \frac{11}{9} + n^2$$

$$n^2 = 2 - \frac{11}{9} = \frac{7}{9}$$

$$n = \sqrt{\frac{7}{9}} = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

Q) If $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{29}$, find the value of $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$.

यदि $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{29}$ है, तो $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$\cos \theta + \sin \theta = \frac{1}{29}$$

$$\sin \theta - \cos \theta = n$$

$$1^2 + 1^2 = \left(\frac{1}{29}\right)^2 + n^2$$

$$n^2 = \frac{1681}{841}$$

$$n = \sqrt{\frac{1681}{841}} = \frac{41}{29} \Rightarrow \sin \theta - \cos \theta$$

$$\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$$

$$\frac{\frac{1}{29}}{\frac{41}{29}} = \frac{1}{41}$$

Q) If $\sin \theta - \cos \theta = \frac{7}{17}$, then find the value of $\sin \theta + \cos \theta$

यदि $\sin \theta - \cos \theta = \frac{7}{17}$ है, तो $\sin \theta + \cos \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$\cos \theta + \sin \theta = n$$

$$1^2 + 1^2 = \left(\frac{7}{17}\right)^2 + n^2$$

$$2 = \frac{49}{289} + n^2$$

$$n^2 = 2 - \frac{49}{289}$$

$$\frac{578 - 49}{289} = \frac{529}{289}$$

$$n = \sqrt{\frac{529}{289}} = \frac{23}{17}$$

- Q) If $3 \sin x + 4 \cos x = 2$, then find the value of $3 \cos x - 4 \sin x$ is:
 यदि $3 \sin x + 4 \cos x = 2$ तो $3 \cos x - 4 \sin x$ का मान ज्ञात करें।

$$3 \cos x - 4 \sin x = n$$

$$3^2 + 4^2 = 2^2 + n^2$$

$$9 + 16 = 4 + n^2$$

$$21 = n^2$$

$$n = \sqrt{21}$$

* Questions Based On Some Other Basic Identities like:-

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \frac{\sin A - \cos A + 1}{\sin A + \cos A - 1} &= \frac{1}{\sec A - \tan A} \\ &= \sec A + \tan A \\ &= \frac{1 + \sin A}{\cos A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \frac{\cos A + \sin A - 1}{\cos A - \sin A + 1} &= \operatorname{cosec} A - \cot A \\ &= \frac{1 - \cos A}{\sin A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad \frac{\cos A - \sin A + 1}{\cos A + \sin A - 1} &= \operatorname{cosec} A + \cot A \\ &= \frac{1 + \cos A}{\sin A} \end{aligned}$$

Q) If $\frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} = p \sec \theta + q \tan \theta$ where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ then what is the value of $p+q$?

यदि $\frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} = p \sec \theta + q \tan \theta$ जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है तो $p+q$ का मान क्या है?

$$\frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1}$$

$$\sec \theta + \tan \theta$$

$$p=1 \quad q=1$$

$$p+q=2$$

1. If $A + B + C = 180^\circ$ and $\tan A = \frac{1}{2}$, $\tan B = 3$, then what will be the value of $\tan C$?

यदि $A + B + C = 180^\circ$ और $\tan A = \frac{1}{2}$, $\tan B = 3$, तो $\tan C$ का मान क्या होगा?

(A) $-\frac{5}{3}$

(B) $\frac{5}{3}$

(C) $\frac{7}{2}$

(D) 7

2. If $\tan A = \frac{2}{3}$, $\tan B = \frac{3}{4}$, and $\tan C = k$, and $A + B + C = 90^\circ$, then what will be the value of k ?

यदि $\tan A = \frac{2}{3}$, $\tan B = \frac{3}{4}$, और $\tan C = k$, तथा $A + B + C = 90^\circ$, तो k का मान क्या होगा?

(A) $17/6$

(B) $15/6$

(C) $12/5$

(D) $19/6$

3. If $\cot \theta + \cos \theta = x$ & $\cot \theta - \cos \theta = y$, then the value of $(x^2 - y^2)$ is:

यदि $\cot \theta + \cos \theta = x$ और $\cot \theta - \cos \theta = y$, तो $(x^2 - y^2)$ का मान है:

(a) $4\sqrt{xy}$ (b) $2xy$

(c) $2\sqrt{xy}$ (d) $4xy$

4. If $\tan x + \sin x = m$ and $\tan x - \sin x = n$, then $(m^2 - n^2)$ is equal to:

यदि $\tan x + \sin x = m$ और $\tan x - \sin x = n$, तो $(m^2 - n^2)$ बराबर है:

(a) $4\sqrt{mn}$ (b) $\sqrt{mn}$

(c) $2\sqrt{mn}$ (d) $4mn$

5. If $3\sin x + 5\cos x = 5$, then the value of $(3\cos x - 5\sin x)^2$ is:

यदि $3\sin x + 5\cos x = 5$, तो $(3\cos x - 5\sin x)^2$ का मान है:

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 9

6. If $a\cot \theta + b\operatorname{cosec} \theta = x^2$ and $b\cot \theta + a\operatorname{cosec} \theta = y^2$, then the value of $(x^4 - y^4)$ is:

यदि $a\cot \theta + b\operatorname{cosec} \theta = x^2$ और $b\cot \theta + a\operatorname{cosec} \theta = y^2$ है, तो $(x^4 - y^4)$ का मान है:

- (a) $a^2 + b^2$
- (b) $a^2 - b^2$
- (c) $b^2 - a^2$
- (d) $(a - b)^2$

7. If a and b are real numbers such that $a\cos \theta + b\sin \theta = 4$ and $a\sin \theta - b\cos \theta = 3$, then $(a^2 + b^2)$ is:

यदि a और b वास्तविक संख्याएँ हैं जैसे कि $a\cos \theta + b\sin \theta = 4$ और $a\sin \theta - b\cos \theta = 3$, तो $(a^2 + b^2)$ है:

- (a) 7
- (b) 12
- (c) 25
- (d) $\sqrt{12}$

8. The value of $\frac{\sin \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta - \cos \theta + 1} \times \sqrt{\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}}$ is :

$\frac{\sin \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta - \cos \theta + 1} \times \sqrt{\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1
- (b) -1
- (c) 2
- (d) -2

9. Find the value $\frac{\sin \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta - \cos \theta + 1} \times \frac{\tan^2 \theta (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1)}{\sec \theta - \tan \theta}$

$\frac{\sin \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta - \cos \theta + 1} \times \frac{\tan^2 \theta (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1)}{\sec \theta - \tan \theta}$ का मान है।

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 4

10. What is $\frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} - \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}$ equal to ?

$\frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} - \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $2\sin q$
- (d) $2\cos q$

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	A	A	D	C	C	A	A	A

Worksheet solution

Sol 1

$$A+B+C=180^\circ$$

$$\tan A = \frac{1}{2}, \tan B = 3$$

$$\tan(A+B) = -\tan C$$

$$\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\tan C$$

$$\frac{\frac{1}{2} + 3}{1 - \frac{1}{2} \times 3} = -\tan C$$

$$-\tan C = \frac{7}{2} \times \frac{2}{-1}$$

$$\tan C = 7$$

Sol 2

$$A+B+C=90^\circ$$

$$\tan A = \frac{2}{3}, \tan B = \frac{3}{4}, \tan C = K$$

$$\tan(A+B) = \tan C$$

$$\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \tan C$$

$$\frac{\frac{2}{3} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}} = K$$

$$= \frac{\frac{8+9}{12}}{\frac{6}{12}} = \frac{17}{6}$$

Sol 3

$$x^2 - y^2 = (\cot \theta + \cos \theta)^2 - (\cot \theta - \cos \theta)^2$$

$$= 4 \cot \theta \cos \theta$$

$$= \frac{4 \cos^2 \theta}{\sin \theta}$$

$$xy = (\cot \theta + \cos \theta)(\cot \theta - \cos \theta)$$

$$= \cos^2 \theta \cdot \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - 1 \right)$$
$$= \cos^2 \theta \cdot \frac{(1 - \sin^2 \theta)}{\sin^2 \theta}$$

$$= \frac{\cos^4 \theta}{\sin \theta}$$

$$\therefore \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} = \sqrt{xy}$$

$$(x^2 - y^2) = 4\sqrt{xy}$$

Sol 4

$$\begin{aligned} m^2 - n^2 &= (\tan x + \sin x)^2 - (\tan x - \sin x)^2 \\ &= 4 \tan x \sin x = \frac{4 \sin^2 x}{\cos x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} mn &= (\tan x + \sin x)(\tan x - \sin x) = (\tan^2 x - \sin^2 x) \\ &= \sin^2 x \cdot \left[\frac{1}{\sin^2 x} - 1 \right] \\ &= \frac{\sin^2 x \cdot (1 - \cos^2 x)}{\cos^2 x} = \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\sin^2 x}{\cos x} = \sqrt{mn}$$

$$(m^2 - n^2) = 4 \sqrt{mn}$$

Sol 5

$$3 \sin x + 5 \cos x = 5 \quad \text{--- (i)}$$

$$3 \cos x - 5 \sin x = a \quad \text{--- (ii)}$$

squaring (i) and (ii) and adding

$$9(\sin^2 x + \cos^2 x) + 25(\cos^2 x + \sin^2 x) = 25 + a^2$$

$$\therefore a^2 = 9$$

Alternative Method

$$a \sin x + b \cos x = m$$

$$a \cos x - b \sin x = n$$

$$a^2 + b^2 = m^2 + n^2$$

$$\therefore (3)^2 + (5)^2 = (5)^2 + a^2$$

$$a^2 = 9$$

Sol 6

squaring and subtracting the given equation-

$$\begin{aligned} (x^4 - y^4) &= a^2 (\cot^2 \theta - \operatorname{cosec}^2 \theta) + b^2 (\operatorname{cosec}^2 \theta + \cot^2 \theta) \\ &= a^2 [\operatorname{cosec}^2 \theta - 1 - \operatorname{cosec}^2 \theta] + b^2 [1 + \cot^2 \theta - \cot^2 \theta] \end{aligned}$$

$$\therefore x^4 - y^4 = b^2 - a^2$$

Sol 7

According to Property -

$$a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2$$

$$a^2 + b^2 = 25$$

Sol 8

$$\frac{\sin \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta - \cos \theta + 1} = \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta}$$

eqn में मान रखने पर

$$\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} \times \left[\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} \times \frac{1 + \sin \theta}{1 + \sin \theta} \right]$$

$$\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} \times \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} = 1$$

Sol 9

$$\frac{\sin \theta + \cos \theta - 1}{\sin \theta - \cos \theta + 1} = \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta}$$

equation में मान रखने पर -

$$= \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} \times \frac{\tan^2 \theta (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1)}{\sec \theta - \tan \theta}$$

$$= \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} \times \frac{\tan^2 \theta \times \cot^2 \theta}{\sec \theta - \tan \theta}$$

$$= \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} \times \frac{1}{\sec \theta - \tan \theta}$$

$$= \frac{1}{\sec^2 \theta - \tan^2 \theta} = 1$$

Sol 10

$$\frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} = \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta}$$

equation में मान रखने पर -

$$= \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}$$

$$= \sec \theta + \tan \theta - (\tan \theta + \sec \theta)$$

$$= \sec \theta + \tan \theta - \sec \theta - \tan \theta$$

$$= 0$$

TRIGONOMETRY

MINIMA & MAXIMA

	Min.	Max.
* $\sin \theta$	-1	$+1$
* $\cos \theta$	-1	$+1$
* $\tan \theta$	$-\infty$	$+\infty$
* $\cot \theta$	$-\infty$	$+\infty$
* $\sec \theta$	$-\infty$	$+\infty$ (except -1 to $+1$)
* $\operatorname{cosec} \theta$	$-\infty$	$+\infty$ (except -1 to $+1$)
* $\sin^2 \theta$	0	$+1$
* $\cos^2 \theta$	0	$+1$
* $\tan^2 \theta$	0	∞
* $\cot^2 \theta$	0	∞
* $\sec^2 \theta$	1	∞
* $\operatorname{cosec}^2 \theta$	1	∞

① $4 + \sin \theta < \begin{matrix} -1 \\ +1 \end{matrix}$
 min. = ?
 max. = ?

$4 - 1 = 3 \rightarrow \text{min.}$

$4 + 1 = 5 \rightarrow \text{max.}$

② $8 - \cos \theta < \begin{matrix} -1 \\ +1 \end{matrix}$
 min. = ?
 max. = ?

$8 - (-1) = 9 \rightarrow \text{max.}$

$8 - (1) = 7 \rightarrow \text{min.}$

③ $4 + \sin^2 \theta$
 $\begin{matrix} \nearrow \\ 0 \end{matrix} \begin{matrix} \searrow \\ 1 \end{matrix}$ max. = ?
 min. = ?

$4 + 0 = 4 \rightarrow \text{min.}$

$4 + 1 = 5 \rightarrow \text{max.}$

Q) $7 + \tan^2 \theta$

$\swarrow \searrow$
 $0 \quad \infty$

$\min = ?$
 $\max = ?$

$7 + 0 = 7 \rightarrow \min$
 $7 + \infty = \infty \rightarrow \max$

$x = \pm a \sin \theta \pm b \cos \theta$

$\min.$ $\max.$
 $-\sqrt{a^2 + b^2}$ $+\sqrt{a^2 + b^2}$

- Q) Find the min. and max. value of the following expressions.
 निम्नलिखित व्यंजकों का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

$7 \sin \theta - 24 \cos \theta$

$\min = -\sqrt{7^2 + 24^2} = -\sqrt{625} = -25$

$\max = +\sqrt{7^2 + 24^2} = +25$

- Q) The maximum value of $(2 \sin \theta + 3 \cos \theta)$ is :
 $(2 \sin \theta + 3 \cos \theta)$ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए :

$+\sqrt{2^2 + 3^2}$

$+\sqrt{4 + 9}$
 $= +\sqrt{13}$

- Q) What is the maximum value of $7 \cos A + 24 \sin A + 32$
 $7 \cos A + 24 \sin A + 32$ का अधिकतम मान क्या है ?

$\sqrt{7^2 + 24^2} + 32$

$+25 + 32$
 57

• Min. value. $-25 + 32$
 $= +7$

- Q) Find the maximum value of $19 \sin \theta + 6 \cot \theta \sin \theta$
 $19 \sin \theta + 6 \cot \theta \sin \theta$ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

$$19 \sin \theta + 6 \times \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \times \sin \theta$$

$$19 \sin \theta + 6 \cos \theta$$

$$\max = +\sqrt{19^2 + 6^2}$$

$$\sqrt{361 + 36}$$

$$\sqrt{397}$$

Q) Find the min. and max. value of $5 \sin \theta + 12 \cos \theta - 3$.

$5 \sin \theta + 12 \cos \theta - 3$ का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

$$\pm \sqrt{5^2 + 12^2}$$

$$\pm \sqrt{169}$$

$$\pm 13 - 3$$

$$13 - 3$$

$$\max \rightarrow 10$$

$$-13 - 3$$

$$-16 \rightarrow \min$$

Q) Find max & min value $8 \sin \theta, 16 \cos \theta$

$8 \sin \theta, 16 \cos \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें:

$$(2^3)^{\sin \theta} \cdot (2^4)^{\cos \theta}$$

$$2^{3 \sin \theta} \cdot 2^{4 \cos \theta}$$

$$= 2^{3 \sin \theta + 4 \cos \theta}$$

$$2^{\pm \sqrt{3^2 + 4^2}} = 2^{\pm \sqrt{25}} = 2^{\pm 5}$$

$$\begin{array}{l} 2^5 \\ 32 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2^{-5} \\ \frac{1}{32} \end{array}$$

$$\left\{ 2^{-5} = \frac{1}{2^5} \right\}$$

Q) Find max & min value of $x^{12 \sin \theta}, x^{5 \cos \theta}$

$x^{12 \sin \theta}, x^{5 \cos \theta}$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned}
 & x^{12\sin\theta + 5\cos\theta} \\
 & x^{\pm\sqrt{12^2+5^2}} \\
 & x^{\pm\sqrt{169}} = x^{\pm 13} \\
 & \quad \swarrow \quad \searrow \\
 & x^{13} \quad x^{-13}
 \end{aligned}$$

⑧ Find minimum and maximum value of $16^{\sin\theta} \cdot 4^{\sin\theta} \cdot 2^{\cos\theta} \cdot 128^{\cos\theta}$
 $16^{\sin\theta} \cdot 4^{\sin\theta} \cdot 2^{\cos\theta} \cdot 128^{\cos\theta}$ का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करें

$$\begin{aligned}
 & (2^4)^{\sin\theta} \cdot (2^2)^{\sin\theta} \cdot 2^{\cos\theta} \cdot (2^7)^{\cos\theta} \\
 & 2^{4\sin\theta} \cdot 2^{2\sin\theta} \cdot 2^{\cos\theta} \cdot 2^{7\cos\theta} \\
 & 2^{6\sin\theta + 8\cos\theta} \\
 & 2^{\pm\sqrt{6^2+8^2}} \\
 & 2^{\pm\sqrt{100}} = 2^{\pm 10} \\
 & \quad \swarrow \quad \searrow \\
 & 2^{-10} \quad 2^{+10}
 \end{aligned}$$

⑨ Find max. & min value of $\sin\theta + \cos(\theta + 30^\circ)$

$\sin\theta + \cos(\theta + 30^\circ)$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

$$\sin\theta + \cos\theta \cdot \cos 30^\circ - \sin\theta \cdot \sin 30^\circ$$

$$\sin\theta + \cos\theta \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin\theta \times \frac{1}{2}$$

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$

$$\frac{1}{2}\sin\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$$

$$\pm \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$\pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}}$$

$$\begin{aligned}
 & \pm \sqrt{\frac{4}{4}} \Rightarrow \pm 1 \\
 & \quad \swarrow \quad \searrow \\
 & -1 \quad +1
 \end{aligned}$$

Q) Find max & min value of $\cos \theta + \sin(\theta + 30^\circ)$.

$\cos \theta + \sin(\theta + 30^\circ)$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

$$\cos \theta + \sin \theta \cdot \cos 30^\circ + \cos \theta \cdot \sin 30^\circ$$

$$\cos \theta + \sin \theta \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos \theta \times \frac{1}{2}$$

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right) \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta$$

$$\frac{3}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta$$

$$\pm \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}}$$

$$\pm \sqrt{\frac{12}{4}} \text{ ③ } \begin{array}{c} \pm \sqrt{3} \\ \swarrow \quad \searrow \\ \sqrt{3} \quad -\sqrt{3} \end{array}$$

* $-1 \leq \sin \theta \leq 1$

$$\downarrow$$

$$-1 < \sin \theta \leq +1$$

$$\downarrow$$

$$-1 \leq \sin 2\theta \leq +1$$

Q) Find maximum, minimum value of $15 \sin\left(\frac{\theta + \pi}{4}\right) + 20 \cos\left(\frac{\theta + \pi}{4}\right)$.

$15 \sin\left(\frac{\theta + \pi}{4}\right) + 20 \cos\left(\frac{\theta + \pi}{4}\right)$ का अधिकतम, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

$$\frac{\theta + \pi}{4} = \alpha$$

$$15 \sin \alpha + 20 \cos \alpha$$

$$\pm \sqrt{15^2 + 20^2}$$

$$\pm \sqrt{625} = \pm 25$$

$$\begin{array}{c} \pm 25 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 25 \quad -25 \end{array}$$

$a \sin^2 \theta + b \cos^2 \theta$

If $a > b$

$\max = a$

$\min = b$

If $b > a$

$\max = b$

$\min = a$

Ex:- $10 \sin^2 \theta + 12 \cos^2 \theta$

$\max = 12$

$\min = 10$

Ex:- $8 \sin^2 \theta - 13 \cos^2 \theta$

$8 \sin^2 \theta + (-13) \cos^2 \theta$

$\max = 8$

$\min = -13$

Q) Find minimum and maximum value of $Y = 3 \sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta$.

$Y = 3 \sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta$ का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

$3 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta + \cos^2 \theta$

$3(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \cos^2 \theta$

$3 + \cos^2 \theta$

$0 \quad +1$

$3+0=3 \quad 3+1=4$

Q) Find minimum and maximum value of $3 \sin^2 \theta - 5 \cos^2 \theta$.

$3 \sin^2 \theta - 5 \cos^2 \theta$ का न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

$3 \sin^2 \theta + (-5) \cos^2 \theta$

$\max = +3$

$\min = -5$

Q) Find the max. & min value of $4 \sin^2 \theta \times 8 \cos^2 \theta$

$4 \sin^2 \theta \times 8 \cos^2 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

$$(2^2)^{\sin^2 \theta} \times (2^3)^{\cos^2 \theta}$$

$$2^{2\sin^2 \theta + 3\cos^2 \theta}$$

$$\frac{2^3}{8} \quad \frac{2^2}{4}$$

Q) Find max & min value of $8^{\sin^2 \theta} 16^{\cos^2 \theta}$

$8^{\sin^2 \theta} 16^{\cos^2 \theta}$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

$$(2^3)^{\sin^2 \theta} \cdot (2^4)^{\cos^2 \theta}$$

$$2^{3\sin^2 \theta + 4\cos^2 \theta}$$

$$\text{max} = 2^4 = 16 \quad \text{min} = 2^3 = 8$$

Q) Find the max. & min value of $9^{\sin^2 \theta} \cdot 27^{\cos^2 \theta}$.

$9^{\sin^2 \theta} \cdot 27^{\cos^2 \theta}$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

$$(3^2)^{\sin^2 \theta} \cdot (3^3)^{\cos^2 \theta}$$

$$3^{2\sin^2 \theta + 3\cos^2 \theta}$$

$$\text{max} = 3^3 = 27 \quad \text{min} = 3^2 = 9$$

$4\sin^2 \theta + 3\cos^2 \theta$

Max	min
$4 \times 1 + 3 \times 1$	$4 \times 0 + 3 \times 0$
$4 + 3$	$0 + 0$
$= 7$	$= 0$

$\sin^{(\text{even})} \theta + \cos^{(\text{even})} \theta$

Max = 1 min = 0 = 45°

Ex: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$

Max = 1

Min = $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

Ex:- $\sin^4 \theta + \cos^6 \theta$

Max = 1

$\theta = 45^\circ \Rightarrow \min$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$$

$$\frac{2+1}{8} = \frac{3}{8}$$

$AM \geq GM$

a, b

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

$$\underline{a+b \geq 2\sqrt{ab}}$$

$x^2 = \frac{1}{x^2}$

min. value = $2\sqrt{ab}$

• $x \Rightarrow \sin \theta \Rightarrow a \sin^2 \theta + b \operatorname{cosec}^2 \theta$

$a > b$

min. value = $2\sqrt{ab}$

If $a < b$

min. value = $(a+b)$

• $x = \cos \theta \Rightarrow a \cos^2 \theta + b \sec^2 \theta$ — if $a > b \Rightarrow \min = 2\sqrt{ab}$

if $a < b \Rightarrow \min = a+b$

• $a \tan^2 \theta + b \cot^2 \theta$

Min = $2\sqrt{ab}$

$Y = a \tan^2 \theta + b \cot^2 \theta \quad (a > 0, b > 0)$

Min

$2\sqrt{ab}$

Max

∞

$Y = a \sin^2 \theta + b \operatorname{cosec}^2 \theta \quad (a > 0, b > 0)$

$Y = a \cos^2 \theta + b \sec^2 \theta \quad (a > 0, b > 0)$

Min^m

$2\sqrt{ab} \quad (a \geq b)$

Min^m

$(a+b) \quad (a \leq b)$

max^m

∞

Q) If $Y = 4 \tan^2 \theta + 9 \cot^2 \theta$ then find the value $Y_{\min}$.

यदि $Y = 4 \tan^2 \theta + 9 \cot^2 \theta$ है, तो Y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ?

$$\min = 2\sqrt{4 \times 9}$$

$$2\sqrt{36}$$

$$2 \times 6 = 12$$

Q) If $Y = 8 \tan^2 \theta + 2 \cot^2 \theta$ then find the value of $Y_{\min}$ is:

यदि $Y = 8 \tan^2 \theta + 2 \cot^2 \theta$ है, तो Y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ।

$$Y_{\min} = 2\sqrt{ab}$$

$$2\sqrt{8 \times 2}$$

$$2\sqrt{16}$$

$$2 \times 4 = 8$$

Q) The least value of $8 \operatorname{cosec}^2 \theta + 25 \sin^2 \theta$ is

$8 \operatorname{cosec}^2 \theta + 25 \sin^2 \theta$ का न्यूनतम मान क्या होगा ?

$$25 \sin^2 \theta + 8 \operatorname{cosec}^2 \theta$$

$$\min = 2\sqrt{25 \times 8}$$

$$2\sqrt{200}$$

$$\text{if } a > b \Rightarrow 2\sqrt{ab}$$

$$2 \times 10\sqrt{2}$$

$$20\sqrt{2}$$

Q) Find minimum value of $4 \sec^2 \theta + 1 \cos^2 \theta$

$4 \sec^2 \theta + 1 \cos^2 \theta$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ।

$$1 \cos^2 \theta + 4 \sec^2 \theta$$

$$\underline{a < b} \quad \min = a + b$$

$$\min \text{ value} = 1 + 4 = 5$$

Q) Find minimum value of $4 \sec^2 \theta + 25 \operatorname{cosec}^2 \theta$.

$4 \sec^2 \theta + 25 \operatorname{cosec}^2 \theta$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ।

$$4(1 + \tan^2 \theta) + 25(1 + \cot^2 \theta)$$

$$4 + 4 \tan^2 \theta + 25 + 25 \cot^2 \theta$$

$$29 + 4 \tan^2 \theta + 25 \cot^2 \theta$$

$$2\sqrt{4 \times 25}$$

$$2\sqrt{100} = 2 \times 10 = 20$$

$$\begin{aligned} \text{II}^{\text{nd}} \min \text{ value} &= (\sqrt{4} + \sqrt{25})^2 \\ &= (2 + 5)^2 \\ &= 7^2 = 49 \end{aligned}$$

$$\frac{29+20}{49}$$

$Y = a \sec^2 \theta + b \operatorname{cosec}^2 \theta \quad (a > 0, b > 0)$

Min.	Max.
$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$	∞

• $\sin \theta \cdot \cos \theta$

$$\frac{1}{2} \times 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$$

$$\frac{1}{2} \sin 2\theta \Rightarrow \begin{array}{cc} \min & \max \\ -1 & +1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{cc} \min & \max \\ -\frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \end{array}$$

• $\sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta$

$$\frac{1}{2^2} \times 2^2 \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta$$

$$\frac{1}{4} \sin^2 2\theta$$

$$\min = \frac{1}{4} \times 0 = 0$$

$$\max = \frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$$


• $\sin^3 \theta \cdot \cos^3 \theta$

$$\frac{1}{2^3} \times 2^3 \sin^3 \theta \cdot \cos^3 \theta$$

$$\frac{1}{8} (\sin^3 2\theta)$$

$$\min = -\frac{1}{8}$$

$$\max = +\frac{1}{8}$$



- Q) Find the minimum and maximum value of $2 \sin \theta \cdot \cos \theta$
 $2 \sin \theta \cdot \cos \theta$ का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

$$\sin 2\theta$$

↓
↓

-1
+1

- Q) Find the minimum and maximum value of $Y = 32 \sin^5 \theta \cdot \cos^5 \theta$.
 $Y = 32 \sin^5 \theta \cdot \cos^5 \theta$ का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

$$32(\sin^5 \theta \cdot \cos^5 \theta)$$

max.

$\frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$

$32 \times \frac{1}{32}$

1

min

$-\frac{1}{2^5} = -\frac{1}{32}$

$32 \times \left(-\frac{1}{32}\right)$

-1

- Q) If $A = \sin^2 \theta + \cos^4 \theta$, for any value of θ , then the value of A is:
 यदि θ के किसी मान के लिए $A = \sin^2 \theta + \cos^4 \theta$ है, तो A का मान है।

$$\sin^{\text{even}} \theta + \cos^{\text{even}} \theta$$

$$\text{max} = 1$$

$$\text{min} = \theta = 45^\circ$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \leq A \leq 1$$

- Q) The maximum value of $1 + \sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) + 2\cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$ for real values of θ is:

Q के वास्तविक मान के लिए $1 + \underbrace{\sin\left(\frac{x}{4} + \theta\right)}_{\max = +1} + \underbrace{2\cos\left(\frac{x}{4} - \theta\right)}_{+1}$ का अधिकतम मान क्या होगा ?

$$1 + 1 + 2 \times 1 = 4$$

$$\begin{aligned} \bullet \frac{x}{4} + \theta &= 90^\circ \quad - \theta + \theta = 90 \\ 2\theta &= 90 \\ \theta &= 45^\circ \end{aligned}$$

$$\bullet \frac{x}{4} - \theta = 0^\circ = \frac{x}{4} = \theta$$

Q) $4\sin^2\theta + 3\cos^2\theta + 6\sin^2\alpha + 7\cos^2\alpha + 8\cos^2\beta$

max value = ?

$$4 + 7 + 8 = 19$$

min value = ?

$$3 + 6 + 8 \times 0 = 9$$

Q) $\underbrace{\sin^2\theta + \cos^2\theta}_{\min = 1} + \tan^2\theta + \cot^2\theta + \sec^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta$

$$\min = 1 + \tan^2\theta + \cot^2\theta + 1 + \tan^2\theta + 1 + \cot^2\theta$$

$$3 + 2(1 + \tan^2\theta + 1 + \cot^2\theta)$$

$$2\sqrt{1 \times 1} = 2$$

$$3 + 2 \times 2 = 3 + 4 = 7$$

Q) If $a \sin^3 x + b \cos^3 x = \sin x \cos x$ and $a \sin x = b \cos x$, then find the value of $a^2 + b^2$, provided that x is neither 0° nor 90°

यदि $a \sin^3 x + b \cos^3 x = \sin x \cos x$ और $a \sin x = b \cos x$ हो, तो $a^2 + b^2$ का मान ज्ञात कीजिए, बशर्ते कि x न तो 0° है और न ही 90° है।

$$a \sin x \cdot \sin^2 x + b \cos^3 x = \sin x \cdot \cos x$$

$$b \cos x \cdot \sin^2 x + b \cos^3 x = \sin x \cdot \cos x$$

$$b \cos x (\underbrace{\sin^2 x + \cos^2 x}_1) = \sin x \cdot \cos x$$

$$b \cos x = \sin x \cdot \cos x$$

$$\boxed{b = \sin x}$$

$$a \sin x = b \cos x$$

$$a \times \cancel{b} = \cancel{b} \cos x$$

$$\boxed{a = \cos x}$$

Putting the value
of $\sin x$ & $\cos x$
in original eqⁿ.

$$a \times (b)^3 + b \times a^3 = a \times b$$

$$\cancel{ab}(a^2 + b^2) = \cancel{ab}$$

$$a^2 + b^2 = 1$$

Q) If $m = a \sec A$ and $y = b \tan A$, then find the value of $b^2 m^2 - a^2 y^2 + \frac{a^2 y^2}{b^2 m^2} + \cos^2 A$.

यदि $m = a \sec A$ और $y = b \tan A$ है, तो $b^2 m^2 - a^2 y^2 + \frac{a^2 y^2}{b^2 m^2} + \cos^2 A$ का मान ज्ञात कीजिए।

$$m^2 = a^2 \sec^2 A$$

$$y^2 = b^2 \tan^2 A$$

$$\frac{m^2}{a^2} = \sec^2 A \Rightarrow \frac{a^2}{m^2} = \cos^2 A$$

$$\frac{y^2}{b^2} = \tan^2 A$$

$$b^2 \times a^2 \sec^2 A - a^2 \times b^2 \tan^2 A + \cos^2 A \times \tan^2 A + \cos^2 A$$

$$b^2 a^2 (\underbrace{\sec^2 A - \tan^2 A}_1) + \underbrace{\sin^2 A + \cos^2 A}_1$$

$$b^2 a^2 + 1$$

1. Find maximum and min . value of $3\sin \theta + 4\cos \theta$.

$3\sin \theta + 4\cos \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

- (a) 5,-5
- (b) -3, 3
- (c) 4,-4
- (d) 1, -1

2. Find maximum and minimum. value of $8\sin \theta + 6 \cos \theta$.

$8\sin \theta + 6 \cos \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

- (a) 8,-8
- (b) 6,-6
- (c) 10, -10
- (d) 5, -5

3. Find maximum and minimum value of $\sin \theta + 12 \cos \theta$.

$5\sin \theta + 12 \cos \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

- (a) 13, -13
- (b) 12, -12
- (c) 5, -5
- (d) 10, -10

4. Find maximum and minimum value of $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$.

$x = \sin^6 \theta + \cos^6 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

- (a) $1, \frac{1}{4}$
- (b) $2, \frac{3}{4}$
- (c) 1, -1
- (d) 2, -1

5. Find maximum and minimum value of $x = \sin^6 \theta + \cos^8 \theta$.

$x = \sin^6 \theta + \cos^8 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

- (a) $1, \frac{3}{16}$
- (b) $2, \frac{3}{16}$
- (c) 1, -1
- (d) $3, \frac{1}{16}$

6. Find maximum and minimum value of $2 - \sin \theta \cos \theta$.

$2 - \sin \theta \cos \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

- (a) $\frac{5}{2}, \frac{3}{2}$
- (b) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$
- (c) 1, -1
- (d) $\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}$

7. Find maximum and minimum value of $3 + \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta$.

$3 + \sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

- (a) $\frac{13}{4}, -\frac{13}{4}$
- (b) $\frac{13}{4}, 3$
- (c) , -1 :
- (d) $\frac{13}{4}, 0$

8. Find maximum and minimum value of $1 - \sin^4 \theta \cdot \cos^4 \theta$.

$1 - \sin^4 \theta \cdot \cos^4 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

- (a) 1, -1
- (b) $1, \frac{15}{16}$
- (c) $1, -\frac{15}{16}$
- (d) $\frac{15}{16}, -\frac{15}{16}$

9. Find maximum and minimum value of $6\sin \theta \cdot \cos \theta + 1 - 2\sin^2 \theta$.

$6\sin \theta \cdot \cos \theta + 1 - 2\sin^2 \theta$ का

अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\sqrt{11}, -\sqrt{11}$
- (b) $\sqrt{10}, -\sqrt{10}$,
- (c) $1, -1$
- (d) $7, -7$

10. Find maximum and minimum value of $1 + 8\sin \theta \cos \theta - 2\sin^2 \theta$

$1 + 8\sin \theta \cos \theta - 2\sin^2 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें

- (a) $\sqrt{17}, -\sqrt{17}$
- (b) $\sqrt{15}, -\sqrt{15}$
- (c) $1, -1$
- (d) $10, -10$

11. Find maximum and minimum value of $\sin \theta \cos \theta + 2 \cos^2 \theta - 1$.

$4\sin \theta \cos \theta + 2\cos^2 \theta - 1$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

- (a) $\sqrt{6}, -\sqrt{6}$
- (b) $\sqrt{5}, -\sqrt{5}$
- (c) $2, -2$
- (d) $\sqrt{8}, -\sqrt{8}$

12. Find the maximum value of $2 + \operatorname{cosec}^2 \alpha$.

$2 + \operatorname{cosec}^2 \alpha$ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -2
- (b) 0
- (c) -3
- (d) ∞

13. Find the maximum value of $2 - \operatorname{cosec}^2 \alpha$

$2 - \operatorname{cosec}^2 \alpha$ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए

- (a) 3
- (b) -3
- (c) 1
- (d) 0

14. The minimum value of $2\sin^2 \theta + 3\cos^2 \theta$ is

$2\sin^2 \theta + 3\cos^2 \theta$ का न्यूनतम मान है

- (a) 0
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 1

15. The minimum value of $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta$

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ का न्यूनतम मान है।

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 7
- (d) 5

16. Maximum value of $(2\sin \theta + 3\cos \theta)$ is

$(2\sin \theta + 3\cos \theta)$ का अधिकतम मान है

- (a) 2
- (b) $\sqrt{13}$
- (c) $\sqrt{15}$
- (d) 1

17. The minimum value of

$4\tan^2 \theta + 9\cot^2 \theta$ is equal to

$4\tan^2 \theta + 9\cot^2 \theta$ का न्यूनतम मान बराबर है

(a) 1

(b) 2

(c) 12

(d) 13

18. Find max&min value of $1 - \sin^2 \theta \cos^2 \theta$.

$1 - \sin^2 \theta \cos^2 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

(a) 2, -2

(b) $1, \frac{3}{4}$

(c) 1, 0

(d) 1, -1

19. Find min value of $4\sin^2 \theta + 9\operatorname{cosec}^2 \theta$.

$4\sin^2 \theta + 9\operatorname{cosec}^2 \theta$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

(a) 12

(b) -12

(c) 9

(d) 4

20. Find min value of $9\cos^2 \theta + 16\sec^2 \theta$.

$9\cos^2 \theta + 16\sec^2 \theta$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

(a) -24

(b) 16

(c) 24

(d) 9

21. Find max&min value of $x = \sin^2 \theta + \cos^4 \theta$

$x = \sin^2 \theta + \cos^4 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें

(a) $\frac{3}{4} \leq x \leq 1$ (b) $-1 \leq x \leq 1$ (c) $-\frac{3}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}$ (d) $1 \leq x \leq 0$

22. Find max value of $\sin^4 \theta + \cos^8 \theta$.

$\sin^4 \theta + \cos^8 \theta$ का अधिकतम मान ज्ञात करें।

(a) 2

(b) 3

(c) 1

(d) 4

23. Find maximum and minimum value $10\sin \theta - 1$

$10\sin \theta - 1$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें

(a) 9, -11

(b) 10, 9

(c) 1, -1

(d) 11, 10

24. Find maximum and minimum value of $2\sin^2 \theta - 3$?

$2\sin^2 \theta - 3$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें?

(a) 12, -3

(b) 9, -3

(c) 10, -3

(d) 1 - 1

25. Find maximum and minimum. value of $4\sin^2 \theta + 7\cos^2 \theta + 5$

$\sin^2 \theta + 7\cos^2 \theta + 5$ का

अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें।

(a) 7, 4

(b) 12, 9

(c) 9, 16

(d) 4, 7

26. Find minimum value of $0\tan^2 \theta + 15\sec^2 \theta$:

$10\tan^2 \theta + 15\sec^2 \theta$ का न्यूनतम मान ज्ञात करें:

(a) 15

(b) 25

(c) 10 (d) 0

27. Find maximum and minimum value of $\sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta$

$\sin^2 \theta \cdot \cos^2 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें

(a) $\frac{1}{4}, 0$

(b) $\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}$

(c) $\frac{1}{4}, \frac{-1}{4}$

(d) None of these

28. Find maximum and minimum value of $\sin^3 \theta \cdot \cos^3 \theta$

$\sin^3 \theta \cdot \cos^3 \theta$ का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें

(a) $\frac{1}{4}, \frac{-1}{4}$

(b) $\frac{1}{8}, \frac{-1}{8}$

(c) $2\sqrt{2}$

(d) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

29. Find maximum and minimum value $\sin^{113} \theta \cdot \cos^{113} \theta$.

$\sin^{113} \theta \cdot \cos^{113} \theta$ अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें

(a) $\frac{1}{2^{113}}, \frac{-1}{2^{113}}$

(b) $1, -1$

(c) $2^{113}, -2^{113}$

(d) None of these

30. $\cos^3 \theta + \sin^3 \theta$ will be maximum when $\theta = ?$

$\cos^3 \theta + \sin^3 \theta$ अधिकतम होगा

जब $\theta = ?$

(a) 15°

(b) 25

(c) 45°

(d) 60°

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	A	A	A	A	B	B	B	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	C	C	C	B	C	B	A	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	A	B	B	A	A	B	A	C

Worksheet solution

Sol 1 = $3 \sin \theta + 4 \cos \theta$

$$\text{Max} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\text{Min} = -\sqrt{a^2 + b^2} \\ = -\sqrt{3^2 + 4^2} = -5$$

Sol 2 $8 \sin \theta + 6 \cos \theta$

$$\text{Max value} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

$$\text{Min value} = -\sqrt{8^2 + 6^2} = -10$$

Sol 3 $5 \sin \theta + 12 \cos \theta$

$$= \sqrt{5^2 + 12^2} = \pm 13$$

$$\text{Max value} = +13$$

$$\text{Min value} = -13$$

Sol 4 $x = \sin^6 \theta + \cos^6 \theta$

$$\text{Maximum} = 1$$

For minimum value put $\theta = 45^\circ$

$$x = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6 = \frac{1}{4}$$

$$\text{Minimum value} = \frac{1}{4}$$

$$= 1, \frac{1}{4}$$

Sol 5 $x = \sin^6 \theta + \cos^6 \theta$

$$\text{Max} = 1$$

For minimum value put $\theta = 45^\circ$

$$x = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6 = \frac{3}{16}$$

$$1, \frac{3}{16}$$

Sol 6 $2 - \sin \theta \cos \theta$

$$\text{Min} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Max} = 2 - \left(-\frac{1}{2}\right) \\ = \frac{5}{2}$$

Sol 7 $3 + \sin^2 \theta \cos^2 \theta$

$$\text{Max} = 3 + \frac{1}{2^2} = 3 + \frac{1}{4} \\ = \frac{13}{4}$$

$$\text{Min} = 3 + 0 = 3$$

Sol 8 $1 - \sin^4 \theta \cos^4 \theta$

Power is even

$$\text{Min} = 1 - \frac{1}{2^4} = \frac{15}{16}$$

$$\text{Max} = 1 - 0 = 1$$

Sol 9

$$6 \sin \theta \cos \theta + 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$3 \sin 2\theta + \cos 2\theta$$

$$= \pm \sqrt{3^2 + 1^2} = \pm \sqrt{10}$$

$$\text{Max} = \sqrt{10}$$

$$\text{Min} = -\sqrt{10}$$

Sol 10

$$1 + 8 \sin \theta \cos \theta - 2 \sin^2 \theta$$

$$4 \sin 2\theta + \cos 2\theta$$

$$= \pm \sqrt{4^2 + 1^2} = \pm \sqrt{17}$$

$$\text{Max} = \sqrt{17}$$

$$\text{Min} = -\sqrt{17}$$

Sol 11

$$4 \sin \theta \cos \theta + 2 \cos^2 \theta - 1$$

$$2 \sin 2\theta + \cos 2\theta$$

$$= \pm \sqrt{2^2 + 1^2} = \pm \sqrt{5}$$

$$\text{Max} = \sqrt{5}$$

$$\text{Min} = -\sqrt{5}$$

Sol 12

$$2 + \operatorname{cosec}^2 \alpha$$

$$\text{Maximum value of } \operatorname{cosec}^2 \alpha = \infty$$

$$\text{Max value} = 2 + \infty = \infty$$

Sol 13

$$2 - \operatorname{cosec}^2 \alpha$$

$$\text{Minimum value of } \operatorname{cosec}^2 \alpha = 1$$

$$\text{Max value} = 2 - 1 = 1$$

Sol 14

$$2 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta$$

$$= 2 \sin^2 \theta + 2 \cos^2 \theta + \cos^2 \theta$$

$$= 2 + \cos^2 \theta$$

$$\text{Minimum value of } \cos^2 \theta = 0$$

$$\text{Min. value} = 2 + 0 = 2$$

Sol 15

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \sec^2 \theta +$$

$$\operatorname{cosec}^2 \theta + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta$$

$$= 1 + 1 + \tan^2 \theta + 1 + \cot^2 \theta + \tan^2 \theta + \cot^2 \theta$$

$$= 3 + 2(\tan^2 \theta + \cot^2 \theta)$$

$$\text{Min value} = 3 + 2 \times 2\sqrt{1 \times 1} = 7$$

Sol 16

$$2 \sin \theta + 3 \cos \theta$$

$$\text{Max} = \sqrt{2^2 + 3^2}$$

$$= \sqrt{13}$$

Sol 17

$$4 \tan^2 \theta + 9 \cot^2 \theta$$

$$\text{Max value} = 2 \times \sqrt{4 \times 9} = 12$$

Sol 18

$$1 - \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$\text{Max} = 1 - (0) = 1$$

$$\text{Max} = 1 - \left(\frac{1}{2^2}\right) = \frac{3}{4}$$

Sol 19 $4 \sin^2 \theta + 9 \operatorname{cosec}^2 \theta$

$$\text{Min} = 2 \sqrt{4 \times 9} \\ = 12$$

Sol 20 $9 \cos^2 \theta + 16 \sec^2 \theta =$

$$\text{Min Value} = 2 \sqrt{9 \times 16} \\ = 2 \times 12 = 24$$

Sol 21 $x = \sin^2 \theta + \cos^4 \theta$
 $\text{Max} = 1$

For Minimum value put $\theta = 45^\circ$

$$x = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3}{4} \leq x \leq 1$$

Sol 22 $\sin^4 \theta + \cos^6 \theta$
 Power are even, then
 Maximum value = 1

Sol 23 $10 \sin \theta - 1$

$$\text{Max} = 10 \times 1 - 1 = 9$$

$$\text{Min} = 10(-1) - 1 = -11$$

Sol 24 $12 \sin^2 \theta - 3$

$$\text{Max} = 12 \times 1 - 3 = 9$$

$$\text{Min} = 12(0) - 3 = -3$$

Sol 25 $4 \sin^2 \theta + 7 \cos^2 \theta + 5$

$$\text{Max value} = 7 + 5 \\ = 12$$

$$\text{Min Value} = 4 + 5 \\ = 9$$

Sol 26 $10 \tan^2 \theta + 15 \sec^2 \theta$

$$= 10 \tan^2 \theta + 15(1 + \tan^2 \theta)$$

$$= 15 + 25 \tan^2 \theta$$

$$\text{Min value} = 15 + 0 \\ = 15$$

Sol 27 $\sin^2 \theta \times \cos^2 \theta$

$$\text{Max} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Min} = 0$$

Sol 28 $\sin^3 \theta \times \cos^3 \theta$

$$\text{Max} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$\text{Min} = \frac{-1}{2^3} = \frac{-1}{8}$$

Sol 29 $\sin^{113} \theta \cdot \cos^{113} \theta$

$$\text{Max} = \frac{1}{2^{113}}, \text{Min} = \frac{-1}{2^{113}}$$

Sol 30 $\cos^3 \theta + \sin^3 \theta$

Maximum value at 45°