Alphabet Test

PART→3

(1). यदि वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत कर दिया जाये; तो बाँये से 12वें अक्षर के दाँये 7वाँ अक्षर

A-M/Z-N

L=12, R=7 (+)

19 → U

(2). यदि वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत कर दिया जाये, तो दाँये से 8वें के बाँये 5वाँ अक्षर

A-M/Z-N

R=8, L=5 (+)

13 → Z

(3). यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों ही अर्धांश विपरीत कर दिए जाए, तो दाँये से दूसरे स्वर के बाँये 7वाँ अक्षर

M-A/Z-N 2+5 8-U

8

AEIOU (B)

① (OR)

⑦ UTSRQPON ①

② ⑧

R=8, L=7

15 → (B) Ans

(4). यदि A से प्रारंभ किया जाये, तथा प्रत्येक Alternate letter को हटा दिया जाये, तो बाँये से 4 वें अक्षर के दाँये 6वाँ अक्षर क्या होगा?

~~A~~B~~C~~D~~E~~F~~G~~H

2 4 6 8

L4, R6 (+)

10 × 2

20 → (T) Ans

⑤. A से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक alternate letter हटा दिया जाये, तो बाँये से 9वें के बाँये 4वाँ अक्षर

~~A~~ B ~~C~~ D ~~E~~ F ~~G~~ H ~~I~~ J ~~K~~ L ~~M~~ N ~~O~~ P ~~Q~~ R ~~S~~ T ~~U~~ V ~~W~~ X ~~Y~~ Z

L = 9, L = 4 (−)

5 → (J) OR 5×2 = 10 → (J)

सम श्रृंखला = Value×2

⑥. सम श्रृंखला में दाँये से 8वें के बाँये 2वाँ अक्षर =

~~A~~ B ~~C~~ D ~~E~~ F ~~G~~ H ~~I~~ J ~~K~~ L ~~M~~ N ~~O~~ P ~~Q~~ R ~~S~~ T ~~U~~ V ~~W~~ X ~~Y~~ Z

R = 8, L = 2 (+)

10 — | 14 − 10

4×2 → 8 → (H)

⑦. A से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक alternate letter हटा दिया जाए, तो बाँये से 8वें के दाँये 3वाँ (Value×2)

L = 8, R = 3 (+)

11×2 = 22 → (V)

⑧. B से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक Alternate letter हटा दिया जाए तो बाँये से 5वें के दाँये 4वाँ (value×2−1)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

~~A~~ B ~~C~~ D ~~E~~ F ~~G~~ H ~~I~~ J ~~K~~ L ~~M~~ N ~~O~~ P ~~Q~~ R ~~S~~ T ~~U~~ V ~~W~~ X ~~Y~~ Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

L = 5, R = 4 (+)

9×2 − 1

18 − 1 = 17 → (Q) Ans