


ROJGAR WITH ANKIT

Syllogism

PART-2

(1) कथन : कुछ ⁵⁰ A, ⁵⁰ B हैं।


निष्कर्ष : (1) कुछ ⁵⁰ B, ⁵⁰ A हैं। ✓
 (2) सभी ¹⁰⁰ A, B हैं। ✗
 (3) कोई A, B नहीं है। ✗



→ निष्कर्ष (1) अनुसरण करता है।

(2) कथन : (1) कुछ ⁵⁰ पतंग ⁵⁰ जहाज हैं।
 (2) कुछ हिरन हीरो हैं।

निष्कर्ष : (1) कुछ पतंग हीरो हैं। ✗₁₊₂
 (2) सभी हीरो पतंग हैं। ✗₁₊₂
 (3) कुछ ⁵⁰ जहाज ⁵⁰ पतंग हैं। ✓₁



→ निष्कर्ष (3) अनुसरण करता है।

बचे हुए दोनों समान हैं।

बचे हुए में से कम से कम किसी एक की value 100 होनी चाहिए—

(3) कथन : (1) कुछ पतंग जहाज हैं।
 (2) कुछ जहाज मशीन हैं।

निष्कर्ष : (1) कुछ पतंग मशीन हैं। ✗₁₊₂



(4) कथन : (1) कुछ ⁵⁰ पतंग ⁵⁰ जहाज हैं।
 (2) सभी ¹⁰⁰ जहाज ⁵⁰ हीरो हैं।

निष्कर्ष : (1) कुछ ⁵⁰ पतंग ⁵⁰ हीरो हैं। ✓₁₊₂
 → निष्कर्ष (1) अनुसरण करता है।

